



ACADEMIA MILITAR

DIRECÇÃO DE ENSINO

**MESTRADO EM CIÊNCIAS MILITARES - ESPECIALIDADE DE
ARTILHARIA**

TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO APLICADA

**CARACTERIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE LESÕES
DECORRENTES DE ACTIVIDADE FÍSICA NAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR MILITAR**

AUTORA: Aspirante Aluna Carina Sofia Rodrigues Carvalho

ORIENTADOR: Major de Infantaria José Custódio Reis Lopes Marques

Lisboa, Julho de 2011



ACADEMIA MILITAR

DIRECÇÃO DE ENSINO

**MESTRADO EM CIÊNCIAS MILITARES - ESPECIALIDADE DE
ARTILHARIA**

TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO APLICADA

**CARACTERIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE LESÕES
DECORRENTES DE ACTIVIDADE FÍSICA NAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR MILITAR**

AUTORA: Aspirante Aluna Carina Sofia Rodrigues Carvalho

ORIENTADOR: Major de Infantaria José Custódio Reis Lopes Marques

Lisboa, Julho de 2011

DEDICATÓRIA

A Marie, futura Prima Bailarina.

AGRADECIMENTOS

Manifesto os meus sinceros agradecimentos a todos os que contribuíram para a realização do Trabalho de Investigação, em especial:

Ao meu orientador, Major de Infantaria José Marques, pela dedicação, apoio, e pelos valiosos conhecimentos e esclarecimentos prestados na condução e elaboração desta investigação.

Ao Coronel Mendes Ferrão, ao Tenente-Coronel Afonso e ao Capitão Rebelo pela disponibilidade e sem os quais não seria possível a aplicação dos inquéritos.

Ao Capitão Soares pela disponibilidade manifestada e por ter fornecido todas as informações que lhe solicitei.

Ao Major Alves pelo apoio na disponibilização de informação.

À Professora Doutora Ana Bandeira e ao Tenente-Coronel Rosinha pelo tempo dispendido no apoio à metodologia do trabalho.

Ao Alferes Silva pelo apoio e auxílio na construção da base de dados e no tratamento dos resultados com o programa SPSS.

Aos inquiridos da Academia Militar e da Academia da Força Aérea que foram prestimosos em responder aos inquéritos e que muito contribuíram para a realização deste estudo.

A minha irmã, Helena, e ao Bruno pelo apoio e ajuda na revisão do trabalho.

A minha família pelo apoio e educação.

Ao Jorge pela compreensão, paciência e incentivo.

Muito Obrigado.

ÍNDICE GERAL

DEDICATÓRIA.....	i
AGRADECIMENTOS	ii
ÍNDICE GERAL.....	iii
ÍNDICE DE FIGURAS	vii
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	ix
ÍNDICE DE QUADROS	xi
ÍNDICE DE TABELAS	xii
LISTA DE ABREVIATURAS.....	xiv
LISTA DE SIGLAS	xv
LISTA DE SÍMBOLOS.....	xvi
RESUMO.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
INTRODUÇÃO.....	1
JUSTIFICAÇÃO DO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO	1
FINALIDADE DO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO.....	2
DELIMITAÇÃO DO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO	2
PERGUNTA DE PARTIDA E PERGUNTAS DERIVADAS DA INVESTIGAÇÃO	2
HIPÓTESES DO TRABALHO.....	3
METODOLOGIA.....	3
SÍNTESE DOS CAPÍTULOS	4
PARTE I – TEÓRICA	5
CAPÍTULO 1 – A ACTIVIDADE FÍSICA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR	
MILITAR	5
1.1 INTRODUÇÃO	5
1.2 CONCEITO DE ACTIVIDADE FÍSICA	5
1.3 A ACTIVIDADE FÍSICA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR MILITAR.....	6
1.3.1 A ACTIVIDADE FÍSICA NA ACADEMIA MILITAR	6
1.3.2 A ACTIVIDADE FÍSICA NA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA	6

1.3.3	A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ACTIVIDADE MILITAR	7
CAPÍTULO 2	– AS LESÕES FÍSICAS	9
2.1	INTRODUÇÃO	9
2.2	DEFINIÇÃO DE LESÃO	9
2.3	CLASSIFICAÇÃO DE LESÃO	10
2.4	SEVERIDADE DA LESÃO	11
2.5	REVISÃO ANATÓMICA	12
2.5.1	NOÇÕES DE ANATOMIA DO OSSO	12
2.5.2	NOÇÕES DE ANATOMIA DO MÚSCULO	13
2.5.3	NOÇÕES DE ANATOMIA DAS ARTICULAÇÕES	13
2.6	CARACTERIZAÇÃO DAS LESÕES	13
2.6.1	LESÕES ARTICULARES.....	13
2.6.1.2	ENTORSES.....	13
2.6.1.3	LUXAÇÕES.....	13
2.6.2	LESÕES MUSCULARES E TENDINOSAS.....	14
2.6.2.1	CÃIBRA.....	14
2.6.2.2	CONTUSÕES.....	14
2.6.2.3	DISTENSÃO MUSCULAR	14
2.6.2.4	CONTRACTURA.....	14
2.6.2.5	ROTURA MUSCULAR	15
2.6.3	FRACTURA	15
CAPÍTULO 3	– A PREVENÇÃO	16
3.1	INTRODUÇÃO	16
3.2	FACTORES DE RISCO	16
3.2.1	FACTORES INTRÍNSECOS	17
3.2.1.1	IDADE E GÉNERO.....	17
3.2.1.2	CONDIÇÃO FÍSICA E DOMÍNIO DA TAREFA	18
3.2.1.3	FACTORES PSICOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS	18
3.2.1.4	MORFOTIPO E COMPOSIÇÃO CORPORAL	19
3.2.2	FACTORES EXTRÍNSECOS	19
3.2.2.1	EQUIPAMENTO	19
3.2.2.2	LOCAL DE TREINO E MATERIAL	20
3.2.2.3	CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS.....	21

3.2.2.4	PLANEAMENTO DO TREINO	21
3.2.2.5	HIGIENE E ALIMENTAÇÃO	22
3.3	CUIDADOS PREVENTIVOS	22
3.3.1	PREVENÇÃO PRIMÁRIA	23
3.3.2	PREVENÇÃO SECUNDÁRIA	23
3.3.2.1	CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE RESPOSTA MÉDICO.....	23
3.3.3	PREVENÇÃO TERCIÁRIA	24
PARTE II - PRÁTICA		25
CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA		25
4.1	INTRODUÇÃO	25
4.2	MÉTODO DE ABORDAGEM.....	25
4.3	PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS.....	25
4.3.1	INQUÉRITOS	26
4.4	MEIOS UTILIZADOS	27
CAPÍTULO 5 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO		28
5.1	INTRODUÇÃO	28
5.2	CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA	28
5.3	ANÁLISE DE RESULTADOS	29
CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES		40
6.1	INTRODUÇÃO	40
6.2	VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES.....	40
6.3	RESPOSTA À PERGUNTA DE PARTIDA.....	42
6.4	REFLEXÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES	43
6.5	LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO	43
6.6	INVESTIGAÇÕES FUTURAS.....	44
BIBLIOGRAFIA		45
GLOSSÁRIO.....		49
APÊNDICES.....		55
APÊNDICE A - SISTEMA ÓSSEO		56

APÊNDICE B - SISTEMA MUSCULAR	58
B.1 CONSTITUIÇÃO DO MÚSCULO	59
B.2 O TÓNUS MUSCULAR	60
B.3 CLASSIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS E FIBRAS MUSCULARES	61
B.4 RELAÇÃO ENTRE OS MÚSCULOS E OS TENDÕES	62
B.5 LESÕES MUSCULARES	62
B.5.1 DISTENSÃO MUSCULAR.....	62
B.5.2 ROTURA MUSCULAR	63
APÊNDICE C - SISTEMA ARTICULAR.....	64
C.1 LESÕES ARTICULARES.....	64
C.1.1 ENTORSE	64
C.1.2 LUXAÇÃO.....	65
APÊNDICE D - MODELO DA ETIOLOGIA DA LESÃO	67
APÊNDICE E - IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO ENTRE ALUNO E EQUIPA MULTIDISCIPLINAR NAS LESÕES FÍSICAS	68
APÊNDICE F - A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO PARA O RENDIMENTO FÍSICO.....	69
F.1 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.....	70
F.1.2 RODA DOS ALIMENTOS PORTUGUESA	72
APÊNDICE G - A CARGA DE TREINO	73
APÊNDICE H - A FADIGA.....	74
APÊNDICE I - A RECUPERAÇÃO	75
APÊNDICE J - INQUÉRITO	76
APÊNDICE L - VALORES ESTATÍSTICOS.....	82
L.1 TABELAS DE FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS DOS INQUIRIDOS	82
L.1.2 RESPOSTAS DO GRUPO A	82
L.1.3 RESPOSTAS DO GRUPO B	85
L.1.4 RESPOSTAS DO GRUPO C	88
APÊNDICE M - DEFINIÇÃO DA AMOSTRA	99
APÊNDICE N - MAPA CONCEPTUAL	100

ÍNDICE DE FIGURAS

INTRODUÇÃO

Figura 0.1: Modelo metodológico.....	4
--------------------------------------	---

CAPÍTULO 1 – A ACTIVIDADE FÍSICA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR MILITAR

Figura 1.1: Vertentes da formação militar	7
---	---

CAPÍTULO 2 – LESÕES FÍSICAS

Figura 2.1: Distribuição da severidade das lesões	12
---	----

CAPÍTULO 3 – A PREVENÇÃO

Figura 3.1: Sistema de resposta médico	24
--	----

APÊNDICE A – SISTEMA ÓSSEO

Figura A.1: Esqueleto humano aspecto anterior	56
---	----

Figura A.2: Fractura da anca aspecto anterior.....	57
--	----

Figura A.3: Fractura exposta aspecto anterior	57
---	----

APÊNDICE B – SISTEMA MUSCULAR

Figura B.1: Músculos do corpo humano aspecto anterior e posterior	58
---	----

Figura B.2: Constituição do músculo	59
---	----

Figura B.3: Músculos do pescoço aspecto posterior.....	60
--	----

Figura B.4: Músculo quadricípite aspecto anterior	61
---	----

Figura B.5: Classificação das fibras musculares.....	61
--	----

Figura B.6: Relação entre músculos e tendões	62
--	----

Figura B.7: Distensão muscular do gêmeo aspecto posterior	62
---	----

Figura B.8: Rotura muscular do gêmeo aspecto posterior	63
--	----

APÊNDICE C – SISTEMA ARTICULAR

Figura C.1: Aspecto normal do tornozelo antes de ocorrer a lesão	64
--	----

Figura C.2: Entorse do tornozelo.....	65
Figura C.3: Aspecto normal da articulação do cotovelo	65
Figura C.4: Subluxação do cotovelo aspecto lateral	66
Figura C.5: Luxação total do cotovelo aspecto lateral	66
Figura C.6: Luxação total do cotovelo com múltiplas fracturas aspecto lateral	66

APÊNDICE D – MODELO DA ETIOLOGIA DA LESÃO

Figura D.1: Modelo dinâmico, multifactorial da etiologia da lesão.....	67
--	----

APÊNDICE F – A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO PARA O RENDIMENTO FÍSICO

Figura F.1: Pirâmide dos alimentos	70
Figura F.2: Pirâmide da alimentação saudável.....	71
Figura F.3: My Pyramid	71
Figura F.4: Roda dos alimentos portuguesa	72

APÊNDICE I – A RECUPERAÇÃO

Figura I.1: Dinâmica da curva de recuperação	75
--	----

APÊNDICE M – DEFINIÇÃO DA AMOSTRA

Figura M.1: Expressão para calcular a dimensão adequada da amostra.....	99
Figura M.2: Validade do Estudo	99

ÍNDICE DE GRÁFICOS

CAPÍTULO 5 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO

Gráfico 5.1: Distribuição da amostra por IESM.	28
Gráfico 5.2: Distribuição da amostra por género	28
Gráfico 5.3: Distribuição da amostra por idade	28
Gráfico 5.4: Proporção de alunos em relação à realização de aquecimento antes de iniciar a AF	29
Gráfico 5.5: Proporção de alunos em relação à realização de alongamentos ou exercícios de retorno à calma	30
Gráfico 5.6: Proporção de alunos em relação à prática de AF em diferentes tipos de superfície	30
Gráfico 5.7: Proporção de alunos em relação à frequência de mudança de calçado	31
Gráfico 5.8: Proporção de alunos em relação ao uso de aparelhos ortopédicos na prática de AF	31
Gráfico 5.9: Proporção de alunos que usam aparelhos ortopédicos em relação ao tipo de aparelho	31
Gráfico 5.10: Proporção de alunos em relação à frequência de lesão	32
Gráfico 5.11: Proporção de alunos em relação ao n.º de lesões no período determinado	32
Gráfico 5.12: Proporção de alunos em relação à frequência de lesões por ano lectivo	33
Gráfico 5.13: Proporção de alunos em relação à natureza das lesões	33
Gráfico 5.14: Proporção de alunos em relação a outros tipos de lesões	34
Gráfico 5.15: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação à sua localização	34
Gráfico 5.16: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação às actividades em que contraíram as lesões	35
Gráfico 5.17: Proporção de alunos que contraíram lesões durante as aulas em relação ao tipo de aula na qual as contraíram	35
Gráfico 5.18: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação à atitude perante as lesões	36
Gráfico 5.19: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação aos serviços médicos recorridos pelos mesmos	36
Gráfico 5.20: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação ao tratamento realizado..	37

Gráfico 5.21: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação à recuperação das mesmas	37
Gráfico 5.22: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação às causas das mesmas segundo a percepção do aluno	38
Gráfico 5.23: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação às implicações futuras das lesões.....	38
Gráfico 5.24: Distribuição da amostra segundo a ocorrência de lesões anteriores	39

ÍNDICE DE QUADROS

CAPÍTULO 2 – AS LESÕES FÍSICAS

Quadro 2.1 – Classificação das lesões.....	11
--	----

CAPÍTULO 3 – A PREVENÇÃO

Quadro 3.1 – Factores de risco	17
--------------------------------------	----

ÍNDICE DE TABELAS

APÊNDICE L – VALORES ESTATÍSTICOS

Tabela L.1: Frequência e percentagem das respostas do total dos inquiridos.....	82
Tabela L.2: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º1.....	82
Tabela L.3: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º2	82
Tabela L.4: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º3	83
Tabela L.5: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4	84
Tabela L.6: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º5	85
Tabela L.7: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º5.1.....	85
Tabela L.8: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º1	85
Tabela L.9: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º2	86
Tabela L.10: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º3.....	86
Tabela L.11: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4.....	86
Tabela L.12: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º5.....	87
Tabela L.13: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º6.....	87
Tabela L.14: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º7.....	88
Tabela L.15: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º7.1.....	88
Tabela L.16: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º1.....	88
Tabela L.17: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º1.1.....	89
Tabela L.18: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º1.2.....	89
Tabela L.19: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º2.....	90
Tabela L.20: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º2.....	90
Tabela L.21: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º3.....	91
Tabela L.22: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º3.....	92
Tabela L.23: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmações a, b, c, d, e	92
Tabela L.24: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmação a	93
Tabela L.25: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmações f, g, h.....	93
Tabela L.26: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmações i, j, l, n,o	94
Tabela L.27: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmações p, q	94
Tabela L.28: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmações r, s, t.....	95

Tabela L.29: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmação u	95
Tabela L.30: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º5.....	96
Tabela L.31: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º5.1.....	96
Tabela L.32: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º6.....	97
Tabela L.33: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º7.....	97
Tabela L.34: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º7.1.....	98

LISTA DE ABREVIATURAS

ed.:	Edição
<i>e.g. (exempli gratia):</i>	por exemplo
<i>et al. (et aliae):</i>	e outros (para pessoas)
<i>i.e. (id est):</i>	isto é
n ^o .:	Número
n.d.:	não disponível
p.:	Página

LISTA DE SIGLAS

AAOS:	American Academy of Orthopaedic Surgeons
AF:	Actividade Física
AFA:	Academia da Força Aérea
AM:	Academia Militar
DGS:	Direcção Geral da Saúde
EN:	Escola Naval
IESM:	Instituições de Ensino Superior Militar
ISS:	Injury Surveillance System
NCAA:	National Collegiate Athletic Association
OMS:	Organização Mundial da Saúde
REFE:	Regulamento de Educação Física do Exército
USDA:	United States Department of Agriculture
USNLM:	United States National Library of Medicine

LISTA DE SÍMBOLOS

D	Nível de precisão
n	Número de indivíduos da amostra
N	Número de indivíduos da população
p	Proporção da população
$Z_{\alpha/2}$	Normal estandardizada
λ	Nível de confiança
%	Porcentagem

RESUMO

A actividade física constitui um dos pilares para a formação militar dos alunos que frequentam as Instituições de Ensino Superior Militar. Esta proporciona a manutenção do bem-estar, saúde e condição física do aluno e estimula o desenvolvimento de qualidades técnicas, tácticas, psicológicas e sociológicas, indispensáveis para o desempenho das suas funções. Porém, durante a prática de actividade física, o aluno encontra-se predisposto e susceptível à ocorrência de lesões físicas.

Este estudo tem como objectivos caracterizar as lesões físicas decorrentes de actividade física nas Instituições de Ensino Superior Militar e identificar as medidas preventivas tomadas pelos alunos.

Esta investigação encontra-se dividida em duas partes. A parte teórica constituída pela revisão de literatura que visa estabelecer um enquadramento conceptual do tema, relacionado com a actividade física e as lesões físicas. A parte prática teve por base a aplicação de questionários para retirar dados relativos à caracterização das lesões e às medidas preventivas, para posteriormente analisar os dados recolhidos e estabelecer algumas conclusões.

Concluiu-se que de entre a natureza das lesões decorrentes da prática de actividade física, as mais frequentes são os entorses ao nível dos membros inferiores. Quanto aos cuidados preventivos, os alunos têm atenção ao equipamento, mas descaram a programação do treino. No seguimento da lesão, a maioria dos alunos recorre ao acompanhamento médico para o tratamento da mesma, no entanto, a maioria dos alunos ainda não recuperou totalmente da lesão ou a lesão reapareceu.

Com este estudo, propõe-se o desenvolvimento de acções activas que sensibilizem os alunos para os riscos inerentes à prática de actividade física e o desenvolvimento de um processo de avaliação funcional do estado físico do aluno após um período de recuperação.

Palavras-Chave: ACTIVIDADE FÍSICA, LESÕES FÍSICAS, PREVENÇÃO.

ABSTRACT

Physical activity is a cornerstone for the training of military students who attend the Military Institutions of Higher Education. This provides the continued well-being, health and physical condition of the student and encourages the development of technical skills, tactical, psychological and sociological, indispensable for the performance of their duties. However, during physical activity, the student is prone and susceptible to the occurrence of physical injuries.

This study aims are the characterization of physical injuries from physical activity in the Military Institutions as well as identify the preventive measures taken by the students.

This investigation is divided in two parts. The theoretical part that is resumed to a literature revision that establishes a conceptual guideline of theme, related to Physical Activity and physical injuries, finishing with some preventive measures analysis. The practical part consists in an application of questionnaires with the objective to collect data about the injuries in physical activity, for later, analyze the data collected to establish some conclusions.

It was concluded that from the nature of the injuries resulting from physical activity, the most frequent are sprains at level of the lower limbs. As for preventive care, students have attention to equipment, but neglect the training program. Following the injury, most students turn to medical care for the treatment, however, most students have not fully recovered from the injury or the injury reappeared.

With this study, it is proposed the development of active measures to sensitive students to the risks inherent in physical activity and the development of a process of functional evaluation of the student's physical condition after a recovery period.

Keywords: PHYSICAL ACTIVITY, PHYSICAL INJURIES, PREVENTION.

*“A Actividade física deverá comportar-se como uma
fonte de saúde e não como factor de doença”*

(Massada 2003, p.106)

INTRODUÇÃO

“We expect highly paid athletes to be in outstanding physical shape and to have the best sports medical care possible when they step onto the field of “battle”, but what about our country’s true soldiers? How are we helping military “athletes” achieve optimal physical fitness levels and prevent injuries while keeping them in the most important “game” of all – protecting our country!”

Odate, 2004

O presente Trabalho de Investigação Aplicada (TIA) está inserido no Tirocínio para Oficial de Artilharia (TPO-A) e é subordinado ao tema, “Caracterização e Prevenção de lesões decorrentes de actividade física nas Instituições de Ensino Superior Militar”.

JUSTIFICAÇÃO DO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO

Segundo o Regulamento de Educação Física do Exército (REFE) (2002), o valor de um Exército está assente no valor dos seus soldados. O valor dos soldados é determinado por um conjunto de capacidades e qualidades psicomotoras, éticas, culturais e sociais adquiridas e cimentadas ao longo da sua “Formação Militar”. Formação essa que engloba três grandes componentes, a componente técnico-táctica, a componente moral/cívica, e a componente física (REFE, 2002). O Exército moderno, caracterizado pelos progressos a nível tecnológico e de armamento, requer cada vez mais pessoal especializado (REFE, 2002). A exigência de uma especialização técnico-táctica do militar tende a sobrevalorizar o valor da componente física (REFE, 2002), mas apesar dos inúmeros progressos a nível tecnológico dos materiais, a peça essencial da doutrina de um Exército continuará a ser a componente humana (Rodrigues, 2007). Perante o combate isolado, em situações de stress e inquietação, é fulcral o empenhamento moral, físico e psíquico do combatente (REFE, 2002).

A vertente física é particularmente importante não só para o desenvolvimento das capacidades físicas, mas contribui valiosamente para o carácter e valor moral do indivíduo (REFE, 2002). No entanto a capacidade física é constantemente ameaçada pela inevitabilidade de lesões, “...o exercício deve ser aplicado como um fármaco, ou seja, devemos procurar a dose mínima capaz de estimular a resposta óptima e administrá-la em

períodos tais que permitam a recuperação do organismo e a minimização dos efeitos laterais” (Carneiro, Lopes & Moreira, 2002. p.8)

A ocorrência de lesões durante a actividade física (AF) é uma realidade. Apesar da AF envolver princípios que assentam num desenvolvimento saudável do indivíduo, deparamo-nos com uma realidade em que os princípios são colocados à margem quando se atingem limites perigosos para o bem-estar do indivíduo (Ferreira de Castro, 2005).

FINALIDADE DO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO

Assumindo a importância do exercício físico para a formação do militar, com este trabalho pretende-se realizar um estudo sobre as lesões decorrentes de AF nas Instituições de Ensino Superior Militar (IESM). Procura-se especificamente, caracterizar as lesões decorrentes da AF e identificar as medidas preventivas possíveis para fazer face à sua ocorrência.

A consciencialização para os riscos inerentes à prática de AF pode ser materializada através da transmissão de conhecimento necessário para que este invista numa condição física duradoura com o mínimo de consequências negativas para a sua vida (Ferreira de Castro, 2005).

DELIMITAÇÃO DO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO

O estudo de lesões decorrentes de AF é muito amplo. São inúmeras as vertentes relacionadas com as lesões, o que torna impossível um domínio total do tema, tornando-se imperativo definir limites de análise do estudo. Sendo assim, define-se como campo de estudo as lesões físicas músculo-esqueléticas¹ decorrentes de AF nas IESM, nomeadamente na Academia Militar (AM) e na Academia da Força Aérea (AFA). Limitou-se a análise à caracterização deste tipo de lesões e às medidas preventivas que podem fazer face à sua ocorrência.

PERGUNTA DE PARTIDA E PERGUNTAS DERIVADAS DA INVESTIGAÇÃO

O estudo desenvolveu-se em torno de uma pergunta de partida: **“Qual a caracterização das lesões e das medidas preventivas no que respeita à prática de actividade física nas Instituições de Ensino Superior Militar?”**

Partindo desta pergunta foram elaboradas as seguintes perguntas derivadas:

1. Qual a frequência de lesões nas Instituições de Ensino Superior Militar?

¹ Sistema músculo-esquelético é o sistema constituído pelos ossos, músculos e articulações (Proença, 2008).

2. Qual a natureza e localização das lesões músculo-esqueléticas que ocorrem com maior frequência?
3. Quais as actividades físicas em que surge um maior número de lesões?
4. Como se relaciona a ocorrência de lesões nos alunos com o emprego de medidas preventivas por parte dos mesmos?
5. A que tipos de serviços médicos recorrem os alunos na sequência da lesão contraída?
6. Qual a situação do aluno no que respeita à recuperação da lesão?

HIPÓTESES DO TRABALHO

Para estas perguntas derivadas foram levantadas as seguintes hipóteses:

H1: A maioria dos alunos contrai pelo menos uma lesão durante os quatro anos de frequência na Instituição de Ensino Superior Militar.

H2: As lesões mais frequentes são entorses contraídas ao nível dos membros inferiores.

H3: A maioria das lesões sofridas pelos alunos são contraídas durante as aulas de Instrução Militar.

H4: Os alunos que fazem sempre aquecimento antes da actividade física sofrem menos lesões do que aqueles que só fazem por vezes.

H5: Os alunos que sofrem lesões recorrem, na sua maioria, a serviços de saúde militares.

H6: Os alunos que contraíram lesões estão totalmente recuperados das mesmas.

METODOLOGIA

A metodologia seguida baseia-se nas normas designadas por Quivy & Campenhoudt (2008) para questões de orientação de investigação e nas normas designadas por Sarmiento (2008) para questões de natureza estrutural. Ambas as normas foram adaptadas segundo as Orientações para Redacção de Trabalhos da Academia Militar (2008).

Neste trabalho distinguem-se duas partes, uma teórica baseada numa revisão de literatura fundamentada em bibliografia especializada de fontes primárias, isto é, fontes textuais e impressas como livros de um ou mais autores e fontes secundárias como publicações periódicas e textos electrónicos.

A parte prática do trabalho apoia-se num conjunto de inquéritos, com vista a verificar as hipóteses previamente levantadas, procurando desta forma a efectivação da investigação que se propôs efectuar.

A Figura 0.1 esclarece o modelo metodológico seguido.




Figura 0.1: Modelo metodológico.

Fonte: Adaptado de Quivy e Campenhoudt (2008).

SÍNTESE DOS CAPÍTULOS

O presente trabalho encontra-se organizado numa Introdução e duas Partes.

A parte teórica possui três capítulos e inclui, de forma sistematizada e objectiva, o ponto de situação dos vários conceitos que a temática em causa engloba. O primeiro capítulo é dedicado à AF. O segundo capítulo trata das lesões físicas e inclui uma breve revisão anatómica. O terceiro capítulo apresenta a temática da prevenção, nomeadamente os factores de risco e os cuidados preventivos.

Posteriormente apresenta-se a parte prática, que se inicia com o quarto capítulo. Este capítulo aborda a metodologia utilizada para a realização desta investigação, analisando a fase exploratória e os passos seguidos para a realização da sustentação teórica e para a realização e utilização das técnicas que constituíram a parte prática desta investigação. No quinto capítulo, apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos. Por último, no sexto capítulo encontram-se as reflexões conclusivas da investigação.

PARTE I – TEÓRICA

CAPÍTULO 1 – A ACTIVIDADE FÍSICA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR MILITAR

1.1 INTRODUÇÃO

A importância que se atribui à AF tem crescido consideravelmente e de forma proporcional com o acréscimo das investigações realizadas neste âmbito. A literatura assume de forma unânime, que a prática regular de AF é uma das melhores formas de promover a saúde.

Ao nível das IESM, a AF assume-se como um dos pilares para a formação dos futuros Oficiais do Exército, Guarda Nacional Republicana e Força Aérea, contribuindo, a par do nível físico, com benefícios a nível social e mental.

Este capítulo tem por objectivo caracterizar a AF desenrolada nas IESM. Como tal, é definido o conceito de AF, seguindo-se uma descrição da AF que se desenvolve ao nível das IESM e por fim realça-se a importância da Educação Física na actividade militar.

1.2 CONCEITO DE ACTIVIDADE FÍSICA

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2011), a AF é definida como qualquer movimento corporal produzido pelo sistema músculo-esquelético que implica dispêndio de energia. No entanto, o conceito de AF é multidimensional pois envolve características como a intensidade, duração, frequência, circunstâncias, e pode englobar qualquer tipo de movimento (Basset, 2000).

De acordo com Aires (2009), a AF abrange três vertentes: a AF voluntária (engloba a AF planeada e estruturada com uma determinada duração e realizada para promover um ou mais atributos da condição física); a AF quotidiana (inclui o andar, as tarefas domésticas e ocupacionais) e a actividade espontânea e involuntária (inclui todos os movimentos do corpo desde um simples piscar de olhos às contracções musculares).

O exercício e o desporto (AF voluntária) são subdivisões da AF e representam dois conceitos distintos (Caspersen *et al.*, 1985). O mesmo autor define exercício como uma AF planeada, estruturada e repetitiva cujo objectivo é manter ou melhorar um ou mais componentes da aptidão física. Porém, o desporto é uma forma ainda mais específica de AF, caracterizada por ser estruturada, planeada, competitiva e sujeita a regras (Kaplan *et al.*, 1993). A AF inclui o exercício e o desporto por isso envolve todo o tipo de movimento, desde mexer os dedos a participar num triatlo (Kaplan *et al.*, 1993).

Porém, a definição de AF adoptada para a investigação insere-se no contexto militar. O conceito de AF constitui por si só a noção de educação física militar, a qual “...tem sido frequentemente entendida como o conjunto das actividades físicas praticadas no seio do Exército, as quais, associadas à instrução técnica e tática, visam a preparação para o combate” (REFE, 2002, p.1-2).

1.3 A ACTIVIDADE FÍSICA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR MILITAR

1.3.1 A ACTIVIDADE FÍSICA NA ACADEMIA MILITAR

De acordo com o Plano de Formação Militar (PIFM) do ano lectivo de 2010/2011, a formação de Educação Física a ministrar aos alunos da AM, tem como objectivos gerais:

- a) “Desenvolver as componentes condicionais e coordenativas;”
- b) “Aplicar um conjunto de exercícios como meio prioritário e operacional de preparação dos alunos, consubstanciando as adaptações físicas, técnicas, táticas, psicológicas e sociológicas, fundamentais para a consecução de um elevado desempenho das tarefas e funções militares;”
- c) “Criar hábitos saudáveis e estilos de vida activa, desenvolvendo o gosto pela prática física e desportiva.”

Na AM distinguem-se as actividades:

- 1. Preparação Física Geral (PFG – corrida contínua, “fartlek”, treino intervalado, treino em circuito);
- 2. Treino Físico de Aplicação Militar (TFAM – Ginástica de Aplicação Militar, Esgrima, Judo, Boxe, Combate Corpo a Corpo, Natação Militar);
- 3. Desportos (Ginástica, Equitação, Natação, Natação Militar)

1.3.2 A ACTIVIDADE FÍSICA NA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA

De acordo com o Planeamento e Avaliação da Disciplina de Educação Física para o ano lectivo 2010/2011, a disciplina de Educação Física e Desportos a ministrar aos alunos da AFA tem como objectivos:

- a) “Desenvolver as capacidades condicionais e coordenativas para níveis consentâneos com um desempenho motor eficiente e eficaz adaptado às necessidades da missão;”
- b) “Desenvolver nos alunos capacidades e competências psicomotoras preparatórias das situações reais de combate;”
- c) “Corrigir posturas e atitudes e contribuir para o desenvolvimento da disciplina, espírito de corpo e camaradagem;”

d) “Reforçar o gosto pela prática regular da actividade física e aprofundar a compreensão da sua importância como factor potenciador de saúde e de qualidade de vida.”

Na AFA, distinguem-se as actividades:

1. Treino Físico Militar (TFM);
2. Desportos Colectivos (DCL – Andebol, Basquetebol, Corfebol, Futebol, Voleibol);
3. Técnicas de Transposição de Obstáculos (TTO);
4. Desportos individuais/Desportos de Confrontação Directa (DICD);
5. Desportos de combate e Defesa pessoal (Judo/ Krav Maga);
6. Ginástica Desportiva (GIN 1, GIN 2, GIN 3);
7. Pentatlo Aeronáutico (PAIM) ;
8. Treino Específico da Força (TF).

1.3.3 A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ACTIVIDADE MILITAR

É a aptidão do militar que dita o sucesso do seu empenho e esta é constituída por determinadas qualidades inseridas em três vertentes: técnico-táctica, moral/cívica e física (Rodrigues, 2007), como mostra a Figura 1.1.




Figura 1.1: Vertentes da formação militar.

Fonte: Adaptado de Rodrigues (2007, p.38).

Uma boa condição física facilita ao militar a obtenção de maior motivação através de uma atitude mais activa e empreendedora no seu quotidiano, reflectindo-se no colectivo em unidades mais motivadas e mais fortes física e psicologicamente (Rodrigues, 2007). O mesmo autor afirma que a Educação Física na actividade militar procura também desenvolver um conjunto de capacidades psicológicas que se criam no íntimo do militar e que influenciam o seu rendimento através da “...vontade de fazer...”.

No entanto, um aspecto indissociável da Educação Física no desempenho das funções do militar são as lesões que decorrem da AF (Rodrigues, 2007). De acordo com a sua gravidade, a lesão pode tornar-se impeditiva da continuação normal da instrução ou mesmo

da prossecução do próprio curso (Rodrigues, 2007). Neste caso, mesmo que o militar conclua o seu curso, "...apesar de lhes ser atribuída a qualificação correspondente, ficam impossibilitados de um dia virem a desempenhar funções para as quais foram preparados, por terem contraído lesões que se tornaram crónicas" (Rodrigues, 2007, p.40).

CAPÍTULO 2 – AS LESÕES FÍSICAS

2.1 INTRODUÇÃO

As limitações de nível físico do militar tornam-no vulnerável perante a agressividade e rigidez de um ambiente de combate.

As lesões acompanham e assombram não só o equilíbrio físico, mas também o equilíbrio psíquico e social dos praticantes de AF.

Este capítulo destina-se à temática das lesões. Como tal inicia-se com a definição de lesão e segue-se uma abordagem à classificação e severidade das lesões. Por fim, de forma simples e sucinta, efectua-se uma revisão anatómica dos órgãos envolvidos na ocorrência de lesões físicas músculo-esqueléticas, visando familiarizar o leitor com os termos técnicos a abordar.

2.2 DEFINIÇÃO DE LESÃO

Massada (2003) refere a dificuldade do estudo da traumatologia² desportiva pela existência de um número diversificado de definições de lesão.

A definição de lesão compreende duas ideias-chave: “Lesão será todo e qualquer traumatismo referido pelo atleta durante um período específico da prática desportiva”; “Lesão será toda a patologia traumática que determina uma paragem da actividade desportiva” (Massada, 2003, p.102).

“O Conselho da Europa define lesão desportiva como uma patologia traumática adquirida durante um jogo ou prática desportiva, causando uma ou mais das seguintes condições: redução da actividade, necessidade de tratamento ou aconselhamento médico e/ou consequências negativas do ponto de vista económico e social” (Ferreira de Castro, 2005, p. 17).

O National Collegiate Athletic Association (NCAA) dos EUA desenvolveu um sistema denominado Injury Surveillance System (ISS), em 1982, com o intuito de estabelecer um conjunto comum de lesões e seus respectivos factores de risco para analisar as lesões desportivas que ocorrem a nível universitário (Pheiffer *et al.*, 1998). Segundo este sistema, uma lesão para ser considerada como tal deve respeitar três critérios: a lesão ocorre como resultado da participação de treinos ou competições; exige cuidados médicos e implica a paragem da prática de exercício físico durante um ou mais dias excluindo o dia de ocorrência da lesão (Pheiffer *et al.*, 1998).

² Estudo que envolve as lesões produzidas por uma acção violenta de um agente exterior (Proença, 2008).

Apesar da diversidade de definições, Ferreira de Castro (2005) refere que os estudos atribuem importância a três critérios:

1. A implicação de paragem na AF.
2. A necessidade de tratamento/observação.
3. A alteração da *performance* do indivíduo.

De modo a quantificar a ocorrência de lesões, torna-se necessário distinguir dois conceitos: a incidência da prevalência. (Massada, 2003). A “...incidência representa uma medida descritiva de novas ocorrências durante um período específico de tempo, enquanto a prevalência representa uma avaliação da presença de lesão num período ou ponto específico de tempo” (Massada, 2003, p.100).

2.3 CLASSIFICAÇÃO DE LESÃO

As lesões podem ser classificadas segundo diferentes critérios tais como: a gravidade, localização, tipo, lado do corpo e inclusive pela possibilidade de ser reincidente ou não (Ferreira de Castro, 2005).

Podemos caracterizar as lesões em macrotraumáticas e microtraumáticas. As lesões macrotraumáticas são originadas por um movimento repentino directo (Kjaer *et al.*, 2003) que provoca lesão, pois a sua energia é superior à capacidade de resistência do tecido lesado (Barata *et al.*, 1997). O macrotraumatismo é característico de actividades que envolvem contacto físico e gestos explosivos, como um desporto de contacto (e.g. luta ou futebol) ou um desporto de alta velocidade (e.g. esqui *downhill*³) (Kjaer *et al.*, 2003).

As lesões microtraumáticas são provocadas pela actividade repetitiva (*i.e.* que exigem um gesto desportivo repetitivo) de baixo impacto, e.g. nadar, andar de bicicleta ou correr (Kjaer *et al.*, 2003). O microtraumatismo envolve o contacto com agentes agressores (e.g. solo duro, contacto da bola de ténis com a raquete) (Barata *et al.*, 1997). Este tipo de lesões resulta da incapacidade dos tecidos (tendão e músculo) se adaptarem à carga repetitiva (Kjaer *et al.*, 2003).

As lesões microtraumáticas também são chamadas de lesões de sobrecarga (Barata *et al.*, 1997) ou lesões crónicas, enquanto os macrotraumatismos também podem ser denominados de lesões agudas (Kjaer *et al.*, 2003).

Para Massada (1989), as lesões podem receber uma outra designação: lesões de *overstress* (agudas ou macrotraumáticas) e lesões de *overuse* ou de sobrecarga (ou

³ Especialidade de esqui alpino (desporto de inverno) baseada numa corrida com curvas e saltos perigosos e na qual se atingem as velocidades máximas de todas as especialidades de esqui (Internet: <http://www.fdiportugal.pt/>).

microtraumáticas). O mesmo autor classifica as lesões de *overuse* em tendinites, fracturas de fadiga, musculopatias e artroses⁴.

O Quadro 2.1 sintetiza a classificação das lesões.

Lesões Macrotraumáticas, agudas ou de overstress	Lesões Microtraumáticas, de sobrecarga ou de overuse
Movimento repentino directo	Actividade repetitiva
<i>E.g.</i> futebol, luta, esqui alpino	<i>E.g.</i> nadar, andar de bicicleta, correr

Quadro 2.1: Classificação das lesões.

2.4 SEVERIDADE DA LESÃO

As lesões também podem ser classificadas segundo a sua severidade (Ferreira de Castro, 2006). Factores como o tempo de paragem e a ausência de AF contribuem na avaliação da gravidade da lesão, pois quanto mais tempo o indivíduo permanecer afastado da AF maior será a gravidade da lesão (Ferreira de Castro, 2005).

Kjaer *et al.* (2003) definem seis critérios para classificar as lesões físicas: a natureza das lesões (a necessidade de recorrer a cuidados médicos é determinada pela natureza da lesão, ou seja, a sua tipologia - entorse, fractura, distensão, luxação ou subluxação); a duração e natureza do tratamento; o tempo desportivo perdido (o tempo de ausência de prática desportiva esclarece acerca das consequências da lesão para o indivíduo; o tempo laboral ou escolar perdido; a incapacidade permanente (lesões graves como fracturas ou lesões a nível dos ligamentos ou tendões podem deixar danos físicos permanentes) e por último os custos das lesões, que se podem dividir em custos directos que englobam os custos do tratamento médico, medicamentos, serviços hospitalares, e os custos indirectos relacionados com a perda de produtividade do indivíduo, nomeadamente o tempo laboral e escolar perdido.

Segundo Ferreira de Castro (2005), o ISS executa o registo da lesão se a sua gravidade implicar o tratamento e observação da lesão antes de o indivíduo retornar à prática desportiva. Segundo este sistema, a gravidade de uma lesão é classificada em cinco níveis:

1. Não registada, se não exigir tempo de paragem;
2. Ligeira, se o tempo de paragem variar entre 1 e 7 dias;
3. Moderada, se o tempo de paragem variar entre 8 e 21 dias;
4. Grave, se o tempo de paragem for superior a 21 dias;
5. Severa, no caso de conduzir a incapacidade permanente.

⁴ A artrose é uma doença que afecta as articulações importantes como as das mãos, pés, joelhos e coluna vertebral (Viana de Queiroz, 2005).

A Figura 2.2 apresenta a distribuição da severidade das lesões.



Figura 2.2: Distribuição da severidade das lesões.

Fonte: Adaptado de Ferreira de Castro (2005, p.23).

2.5 REVISÃO ANATÓMICA

“A anatomia é a ciência em que se estuda a estrutura e a forma dos corpos ou seres organizados” (Pina, 2010, p.3).

O Sistema músculo-esquelético integra os ossos, as articulações e os músculos (Proença, 2008) e é “...entendido como um sistema de alavancas constituído por um braço da alavanca (osso), um ponto de apoio (articulação) e um sistema produtor de força (músculo) ...” (Proença, 2008, p.11).

Segue-se uma abordagem sumária às estruturas locomotoras responsáveis pelas funções de movimento, locomoção e deslocamento a fim de melhor compreender a génese das lesões músculo-esqueléticas.

2.5.1 NOÇÕES DE ANATOMIA DO OSSO

A parte da Anatomia que se dedica ao estudo dos ossos é chamada de Osteologia⁵ (Pina, 2010). “Os ossos são o suporte esquelético do corpo” (Nunes, 1998, p.15). De acordo com o mesmo autor, os ossos constituem as alavancas sobre as quais os músculos exercem a sua acção.

O esqueleto humano é formado por 206 ossos (Pina, 2010) ligados entre si pelas articulações (Nunes, 1998). A superfície dos ossos é constituída por saliências (apófises) sobre as quais assentam os músculos, de modo que quanto mais poderoso for o músculo, mais desenvolvidas serão as superfícies ósseas que o inserem (Nunes, 1998).

⁵ Ver APÊNDICE A.

2.5.2 NOÇÕES DE ANATOMIA DO MÚSCULO

Denomina-se por Miologia⁶ a parte da Anatomia que se dedica ao estudo dos músculos (Pina, 2010). Os músculos constituem cerca de 50% do peso total corporal humano e são responsáveis por fornecer energia aos ossos e às articulações para a execução do movimento (Nunes, 1998).

A contração muscular além de permitir o movimento do corpo, contribui também para a circulação do sangue e da urina e facilita as trocas gasosas durante a respiração (Nunes, 1998). O músculo é constituído por fibras musculares (Pina, 2010) e fixam-se aos ossos através dos tendões (Barata & Coelho, 1998).

2.5.3 NOÇÕES DE ANATOMIA DAS ARTICULAÇÕES

A parte da Anatomia que estuda as articulações é chamada de Artrologia⁷ (Pina, 2010). As articulações são as estruturas que permitem a fixação entre dois ou mais ossos (Nunes, 1998). Estes mantêm-se nas respectivas posições através da existência de ligamentos (Pina, 2010). “As articulações são constituídas pela parte dura (extremidades de dois ou mais ossos) e uma parte mole que serve de ligação para essas extremidades ósseas (ligamentos)” (Rocha, 1967).

2.6 CARACTERIZAÇÃO DAS LESÕES

2.6.1 LESÕES ARTICULARES

2.6.1.2 Entorses

Os entorses⁸ são lesões em que existe uma rotura parcial de um ligamento ou conjunto de ligamentos de uma articulação (Proença, 2008). São lesões provocadas por movimentos que ultrapassam o limite normal do movimento de uma articulação (Rocha, 1967), como por exemplo a acção de pisar uma pedra, que provoca um movimento forçado da articulação, não existindo porém separação das superfícies ósseas, mas podendo originar um entorse com fractura (Nunes, 1998). De todas as lesões, esta é considerada a mais frequente na prática desportiva (Rocha, 1967; Nunes, 1998).

2.6.1.3 Luxações

Ao contrário do entorse, na luxação⁹ existe a perda de contacto das superfícies ósseas e pode ser classificada como total ou parcial (subluxação)¹⁰ (Nunes, 1998; Proença, 2008). De

⁶ Ver APÊNDICE B.

⁷ Ver APÊNDICE C.

⁸ Ver APÊNDICE C.

⁹ Ver APÊNDICE C.

¹⁰ Ver APÊNDICE C.

acordo com Nunes (1998), as luxações podem ser causadas por um choque directo ou devido a um movimento articular em falso. A luxação implica a rotura de ligamentos da articulação e portanto, é considerada uma lesão mais grave do que um entorse não complicado (Nunes, 1998).

2.6.2 LESÕES MUSCULARES E TENDINOSAS

2.6.2.1 Cãibra

A cãibra é uma lesão caracterizada pela contracção involuntária e pela dor intensa que provoca (Nunes, 1998). Este tipo de lesão ocorre normalmente quando o indivíduo recomeça o treino após paragens prolongadas, ou devido à intensidade do próprio treino (Nunes, 1998).

De acordo com o mesmo autor, embora existam diversas causas que possam estar na origem da ocorrência de cãibras, tais como, lesões neurológicas, lesões infecciosas e a carência de sódio ou cálcio, a causa mais frequente de cãibras no desporto é a fadiga.

2.6.2.2 Contusões

É uma lesão provocada por um choque (e.g. choque contra outro atleta, contra o terreno, ou contra outro objecto) (Rocha, 1967) e a sua gravidade depende da intensidade do choque ou da intensidade com que o objecto o atingiu (Nunes, 1998).

2.6.2.3 Distensão Muscular

Segundo Nunes (1998), a distensão¹¹ ocorre ao nível dos músculos quando se atinge o limite de elasticidade da fibra muscular provocando o rompimento de algumas fibras, mantendo, no entanto, a estabilidade da estrutura anatómica. Para Nunes (1998), é uma lesão reversível.

2.6.2.4 Contractura

A contractura resulta do esgotamento e da fadiga¹² e é provocada pela produção em excesso de resíduos metabólicos, como o ácido láctico, prejudiciais para a zona afectada (Nunes, 1998). Em situações mais graves pode conduzir à rotura muscular e por isso é também considerada como uma pré-rotura (Nunes, 1998).

¹¹ Ver APÊNDICE B.

¹² Ver APÊNDICE H.

2.6.2.5 Rotura Muscular

A rotura muscular¹³ resulta do rompimento de um elevado número de fibras musculares, que pode ser classificada de total (*i.e.* quando atinge a totalidade do músculo) ou parcial (mais comum na prática desportiva) e ocorre devido a contracções violentas e exageradas do músculo (Nunes, 1998). O mesmo autor refere que os agentes que propiciam a ocorrência destas lesões são, entre outros, a fadiga¹⁴, o excesso de esforço, cargas de treino¹⁵ muito intensas, as contusões, uma alimentação desequilibrada e a falta de aquecimento.

2.6.3 FRACTURA

“Uma fractura¹⁶ constitui uma rotura na continuidade de um osso” (Proença, 2008, p.30). A ocorrência de fractura é rara durante a prática desportiva, mas é mais frequente em modalidades como o esqui, o montanhismo e o ciclismo (Nunes, 1998).

As fracturas podem ser produzidas por um traumatismo¹⁷ violento, por fadiga ou sobrecarga ou por um traumatismo pequeno (Proença, 2008).

¹³ Ver APÊNDICE B.

¹⁴ Ver APÊNDICE H.

¹⁵ Ver APÊNDICE G.

¹⁶ Ver APÊNDICE A.

¹⁷ “Conjunto de manifestações locais ou gerais provocadas por uma acção violenta contra o organismo” (Manuila, 2004, p.601).

CAPÍTULO 3 – A PREVENÇÃO

3.1 INTRODUÇÃO

Os acidentes e lesões que se verificam na prática de AF podem ser alvo de redução substancial, quer na sua frequência de ocorrência, quer na sua gravidade, desde que se tomem em consideração o cumprimento de regras e cuidados preventivos por parte das entidades envolvidas na prática de AF.

Este capítulo trata da temática da prevenção e inicia-se com uma abordagem aos factores de risco que predis põem e susceptibilizam o indivíduo a contrair lesões e aos cuidados preventivos que podem condicionar esses mesmos factores.

3.2 FACTORES DE RISCO

É possível evitar a ocorrência de lesão se os factores que conduzem ao seu aparecimento forem identificados antecipadamente (Pascoal, 2003). Para Ganhão *et al.* (1998) as lesões têm a sua origem em quatro agrupamentos: factores relacionados com o treino, factores pessoais, factores organizativos e os factores ambientais. Os primeiros, referem-se à planificação do treino que pode conduzir a lesões caso seja executado de forma incorrecta (e.g. a falta de um período de retorno à calma no final do treino) e aos alongamentos e estiramentos, que devem ser incluídos na fase de aquecimento e retorno à calma; os factores pessoais incluem a aptidão física para a modalidade, alterações posturais e a alimentação; os factores organizativos englobam a assistência clínica, o material desportivo e as normas de segurança e por último os factores ambientais, dentro dos quais as condições climatéricas desempenham um papel importante na AF (Ganhão *et al.*, 1998).

De acordo com Massada (1989), os factores de risco que tornam o atleta predisposto e susceptível a lesões dividem-se em factores determinantes e factores favorecedores: os factores determinantes correspondem a relações neuromusculares¹⁸ deficientes que originam um esforço tal que ultrapassa a resistência elástica da fibra muscular dando origem a lesões. Por sua vez, os factores favorecedores dizem respeito a um conjunto de situações que podem conduzir a lesões tais como o treino desportivo, o aquecimento, o perfil morfológico e psicológico do atleta, a fadiga, os solos, o calçado desportivo e as condições ambientais (Massada, 1989).

Os factores de risco podem ainda ser classificados em factores de risco Intrínsecos e Extrínsecos (Horta, 1995; Pfeiffer *et al.*, 1998; Carazzato, 2011; Ferreira de Castro, 2005). Os primeiros estão relacionados com as características do próprio indivíduo, enquanto os

¹⁸ “Relativo aos nervos e aos músculos” (Manuila, 2004, p.430).

factores de risco extrínsecos relacionam-se com a existência de agentes externos correspondentes ao treino do indivíduo (Ferreira de Castro, 2005). Portanto, de acordo com o mesmo autor, a lesão resulta da união de ambos os factores num dado momento¹⁹.

Seguidamente vamos analisar, em detalhe, os factores de risco de lesão, recorrendo à classificação utilizada por Horta (1995) que decompõe os factores de risco em factores de risco intrínsecos e factores de risco extrínsecos como mostra o Quadro 3.1.

Factores de risco intrínsecos	Factores de risco extrínsecos
Idade e Género	Equipamento
Condição física e domínio da tarefa	Local de treino e material
Factores psicológicos e sociológicos	Condições atmosféricas
Morfotipo e composição corporal	Planeamento do treino
	Higiene e alimentação

Quadro 3.1: Factores de risco.

Fonte: Horta, 1995.

3.2.1 FACTORES INTRÍNSECOS

3.2.1.1 Idade e Género

Ferreira de Castro (2005) refere que os atletas de maior idade são mais susceptíveis a lesões musculares, enquanto os mais jovens estão mais vulneráveis a fracturas. Segundo Horta (1995), os atletas mais velhos estão mais sujeitos a lesões articulares e tendinosas e os atletas mais jovens, dada uma maior exigência de rendimento, a uma maior incidência de lesões.

Para alguns autores, a mulher apresenta maior vulnerabilidade a determinadas lesões quando comparativamente ao homem (Horta, 1995; Ireland, 2005; Hirst, 2007).

Horta (1995) considera que a razão para a discrepância de incidência de lesões entre géneros está na diferença da anatomia corporal da mulher e do homem. O mesmo autor refere que a menor massa muscular da mulher, quando comparada com a dos homens, favorece a ocorrência de lesões osteoarticulares²⁰.

Ireland (2005) e Hirst *et al.* (2007) consideram que as lesões que afectam o membro inferior da mulher relacionam-se com a sua anatomia e com níveis hormonais. Ireland (2005) esclarece que as mulheres estão mais predispostas do que os homens a lesões do ligamento cruzado anterior (LCA). A mesma autora menciona que as diferenças anatómicas dos membros inferiores da mulher comparativamente ao homem como o alargamento da

¹⁹ Ver APÊNDICE D.

²⁰ "Relativo aos ossos e às articulações" (Manuila, 2004, p.441).

pélvis, condiciona a que os joelhos adoptem uma posição em valgo²¹ o que favorece o aparecimento de lesões no joelho.

Os níveis hormonais da mulher, principalmente durante o ciclo menstrual, podem potenciar a laxidez²² das articulações que conduzem à ocorrência de lesões (Hirst et al., 2007).

3.2.1.2 Condição Física e Domínio da Tarefa

As lesões têm maior incidência em indivíduos que possuem uma má condição física (Horta, 1995). O domínio corporal do indivíduo é importante para que a técnica seja apreendida da forma mais correcta possível, a fim de evitar lesões originadas por macro e microtraumatismos (Horta, 1995). De acordo com Carazzato (2011), de forma a prevenir a ocorrência de lesões, é necessária a correcção contínua dos erros relacionados com a técnica desportiva.

Contudo, os atletas com boa condição física apresentam-se mais vulneráveis a lesões quando interrompem a AF por um determinado período de tempo, por férias ou doença, pois qualquer paragem causa no indivíduo uma diminuição da força muscular e da capacidade de transporte de oxigénio (Horta, 1995).

3.2.1.3 Factores Psicológicos e Sociológicos

Os factores psicológicos desempenham um papel importante na ocorrência de lesões e na sua recuperação (Horta, 1995). Segundo o mesmo autor, todos os atletas possuem um nível ideal de ansiedade específico de cada um, no entanto, este pode ser prejudicial para a atenção e concentração do atleta conduzindo a um aumento da probabilidade de se lesionarem. Horta considera ainda que níveis baixos de ansiedade provocam a dispersão de atenção, levando o indivíduo a preocupar-se com factores externos à AF; por outro lado, o excesso de ansiedade provoca a diminuição da coordenação neuromuscular e um aumento excessivo do tónus muscular²³.

Da mesma forma, a experiência de um indivíduo na prática de AF constitui-se como um factor importante. Um praticante experiente terá mais facilidade na resolução de determinadas situações (Horta, 1995).

O stress é considerado igualmente como um factor psicológico importante (Prieto, 2007). Carvalho (2009) destaca um estudo realizado no futebol americano que concluiu que os atletas que tinham vivido acontecimentos de vida stressantes estavam mais predispostos à ocorrência de lesões do que aqueles que não tinham vivido.

²¹ O joelho valgo, também designado de “perna em X”, resulta de uma deformação do membro inferior na qual o joelho sofre um desvio para dentro, segundo a linha média do corpo (Baptista, 1924).

²² Laxidez refere-se ao aumento de mobilidade generalizada ou específica de uma articulação (Gonçalves, 2005).

²³ Ver APÊNDICE B.

A personalidade do indivíduo é um factor que poderá predispor à lesão (Massada, 1989). Os desportistas mais reservados e indiferentes são os que sofrem um maior número de lesões (Massada, 1989), enquanto os indivíduos mais extrovertidos estão menos sujeitos a lesionarem-se (Palmeira, 1998).

A relação do indivíduo com o meio envolvente (pais, instrutor e dirigentes), adquire uma enorme importância para o equilíbrio psíquico do mesmo (Horta, 1995). Para Horta, as pressões exercidas por agentes deste meio podem ter consequências negativas para o bem-estar psíquico do indivíduo, provocando elevados níveis de ansiedade, o que propicia o aparecimento de lesões²⁴.

3.2.1.4 Morfotipo e Composição Corporal

Cada modalidade exige um determinado perfil morfológico, porém, a probabilidade de incidência de lesões é maior em situações de desconformidade entre o morfotipo²⁵ do indivíduo e a modalidade praticada (Horta, 1995). Um indivíduo endomorfo²⁶ encontra-se mais predisposto à ocorrência de lesões na prática de corrida de meio fundo²⁷ em relação a um indivíduo ectomorfo²⁸ (Horta, 1995). De acordo com o mesmo autor, dois indivíduos que possuam igual capacidade muscular mas pesos diferentes, provocam cargas stressantes diferentes no seu sistema músculo-esquelético. Sendo assim, o indivíduo com maior peso acarreta um risco mais elevado de lesão do que o indivíduo que possui o peso adequado (Horta, 1995).

3.2.2 FACTORES EXTRÍNSECOS

3.2.2.1 Equipamento

Os cuidados com o equipamento utilizado na prática de AF, nomeadamente o calçado, assumem um papel de grande importância na prevenção de lesões (Horta, 1995). O calçado é “...a mais importante peça do equipamento do desportista” (Nigg, 1986, p.6). Este deve ser adequado a fim de evitar possíveis deformações do pé (Nunes, 1998), obter o melhor desempenho possível, prevenir a sobrecarga do membro inferior e coluna lombar (Massada, 1987).

²⁴ Ver APÊNDICE E.

²⁵ Designa-se por Somatotipologia a uma técnica concebida em 1940 por Sheldon, Stevens e Tracker que categoriza a constituição do indivíduo (segundo características morfológicas passíveis de organização) em três componentes: endomorfismo, mesomorfismo e ectomorfismo. (Rodrigues, 1996).

²⁶ Indivíduo com características de obesidade, volume abdominal e laxidez muscular (Rodrigues, 1996).

²⁷ As corridas de meio fundo correspondem a distâncias compreendidas entre os 800 e os 3000m (Barata & Coelho, 1998).

²⁸ Indivíduo com características de magreza acentuada e com aspecto de fragilidade (Rodrigues, 1996).

Nunes (1998) refere que o calçado não deve permitir grandes aumentos de temperatura, de forma a facilitar a saída do suor do pé, contribuindo para diminuir o desenvolvimento de microrganismos.

Segundo Massada (1987), a escolha do calçado deve ser ponderada e com base em critérios como a forma do sapato, costuras, sola, palmilhas, entre outros. O calçado além de se adaptar ao indivíduo, deve ser apropriado ao tipo de AF (Horta, 1995) e ao tipo de terreno onde se desenvolvem as respectivas actividades, oferecendo ao praticante as condições necessárias ao seu melhor desempenho, tais como, velocidade, agilidade, estabilidade e conforto (Massada, 1987). O mesmo autor faz referência a um estudo realizado nas quatro melhores equipas portuguesas de voleibol e constatou que cerca de 67% dos atletas usavam calçado inadequado para o tipo de piso onde realizavam as competições.

Horta (1995) realça a importância do calçado com o exemplo dos fundistas²⁹ e marchadores, que se tornam susceptíveis a lesões microtraumáticas nos membros inferiores, pois o calçado é inadequado ao tipo de solo mais duro, amortecendo pouco o choque do pé contra o solo. Nigg (1986) faz referência a um estudo de 1977 realizado com atletas de diferentes nacionalidades onde se concluiu que dois em cada três jogadores sofreram lesões todos os anos, sendo 58% destas lesões com incidência nos membros inferiores.

Relativamente à indumentária, esta deve ser a mais adequada às especificações da actividade (Horta, 1995).

3.2.2.2 Local de Treino e Material

De acordo com Massada (1987), as superfícies de treino estão directamente relacionadas com a carga suportada pelos membros inferiores. De acordo com o mesmo autor, a carga será tanto maior quanto mais duras e irregulares forem as superfícies onde se desenvolve a actividade.

Segundo Massada (1987, 1989) os solos não oferecem iguais condições à prática de AF; os solos sintéticos, permitem ao praticante obter maiores velocidades de deslocamento e oferecem melhores condições de conservação. Contudo, devido à sua dureza não possuem grande poder de amortecimento de choque do pé contra o solo, propiciando a ocorrência de lesões de sobrecarga (Massada, 1989). De acordo com o mesmo autor, são os solos naturais, relva e terra batida, que possuem melhores condições no que respeita às características de absorção do poder de impacto. Segundo Horta (1995), os pisos florestais, normalmente em terra batida, apresentam as melhores condições para a prática de corrida, apesar de algumas irregularidades (buracos, pedras salientes) poderem ser prejudiciais no Inverno, pois as chuvas tornam o piso enlameado. Horta (1995) refere que a relva oculta irregularidades no terreno e que a areia promove uma técnica de corrida deficiente. O

²⁹ As corridas de fundo correspondem às corridas de maiores distâncias, nomeadamente os 5000m, 10000 m e a maratona cuja distância é de 42195 m (Barata & Coelho, 1998).

mesmo autor exemplifica com a areia junto ao mar, que por se constituir como um plano inclinado, origina um apoio assimétrico e conduz a lesões de sobrecarga sobre as estruturas mais solicitadas.

Más condições para a prática de AF, tais como, uma pista de tartan com reduzida aderência e amortecimento, caixas de saltos com areia insuficiente ou colchões que se apresentem em mau estado de conservação, propiciam a ocorrência de lesões (Horta, 1995).

3.2.2.3 Condições Atmosféricas

O frio, o calor, a chuva, a humidade são factores importantes no desenrolar da AF (Horta, 1995). Estes factores, para além de tornarem o indivíduo susceptível ao aparecimento de lesões, afectam o seu rendimento (Massada, 1989). O frio pode condicionar o aquecimento do indivíduo, impedindo que este o realize de forma correcta e suficiente (Ganhão *et al.*, 1998). Segundo Horta (1995), a AF desenvolvida em baixas temperaturas envolve contracções rápidas do sistema músculo-esquelético, com o objectivo de aumentar a temperatura corporal, que consequentemente implica maiores riscos de lesões.

As temperaturas elevadas facilitam a desidratação, o que representa um obstáculo ao funcionamento do aparelho locomotor³⁰ (Ganhão *et al.*, 1998) e ao mecanismo de arrefecimento orgânico (Horta, 1995). A chuva e a humidade diminuem a aderência do piso onde se desenrola a actividade propiciando a ocorrência de acidentes, principalmente quedas (Horta, 1995).

3.2.2.4 Planeamento do Treino

O treino deve ser planeado de forma ponderada com base em alguns critérios como a carga de treino³¹, a recuperação³² (Horta, 1995), o aquecimento e o retorno à calma (Ganhão *et al.*, 1998). Segundo Nunes (1998), o aquecimento visa preparar o organismo para os esforços decorrentes da AF. Ganhão *et al.* (1998) refere que um aquecimento incorrecto revela uma planificação errada do treino. Quando o aquecimento é mal direccionado e inadequado às condições climatéricas ou mesmo às características da AF a desenvolver, pode conduzir à ocorrência de lesões (Horta, 1995). No entanto, alguns autores afirmam que não existe qualquer prova de que o aquecimento reduza a ocorrência de acidentes e lesões (Gonçalves & Mendes, 1991)

Além do aquecimento, o retorno à calma surge como uma componente importante do treino de qualquer praticante, pois contribui para recuperação muscular e cardiovascular (Ganhão *et al.*, 1998).

³⁰ O aparelho locomotor “assegura os movimentos da marcha e permite ao indivíduo deslocar-se” (Manuila, 2004, p.371).

³¹ Ver APÊNDICE G.

³² Ver APÊNDICE I.

3.2.2.5 Higiene e Alimentação

Os hábitos higiénicos, principalmente o sono, o repouso, a ausência de álcool, tabaco e do consumo de substâncias dopantes³³, contribuem na redução de risco de lesões (Horta, 1995).

Todos estes factores aliados a uma alimentação equilibrada, caracterizam um estilo de vida saudável e contribuem para a prevenção de lesões (Nunes, 1998).

A alimentação³⁴ e a ingestão de líquidos são fundamentais para a *performance* física do indivíduo (Horta, 1995). O mesmo autor afirma que o álcool tem consequências negativas na AF cerca de 48 horas após a sua ingestão. Os efeitos provocados pelo álcool, tais como a diminuição da atenção, da coordenação motora, dos reflexos, da capacidade de reacção, propiciam o risco de lesão e prejudicam a própria AF (Horta, 1995).

Horta refere ainda que um pequeno-almoço deficiente, com excesso de hidratos de carbono simples³⁵, pode ocasionar fadiga³⁶ nos treinos matinais, o que contribui para o aparecimento de lesões. O mesmo acontece quando existe falta de ingestão de líquidos, principalmente após a AF, que pode conduzir a estados de desidratação³⁷ com as mesmas consequências referidas anteriormente (Horta, 1995).

3.3 CUIDADOS PREVENTIVOS

Quando identificados os factores que propiciam o aparecimento de lesões, torna-se possível determinar medidas de prevenção (Simões, 2005) a fim de reduzir o risco de lesão e a sua severidade (Ferreira de Castro, 2005). Estas medidas preventivas podem dividir-se em dois níveis: aquelas que procuram evitar a incidência de lesão - prevenção primária; e as que após a ocorrência da lesão, procuram minimizar as suas consequências, contribuindo para uma rápida recuperação do indivíduo lesionado - prevenção secundária (Ferreira de Castro, 2005; Horta, 1995; Simões, 2005; Pascoal, 2003). No entanto, é possível identificar um terceiro nível de prevenção. Segundo Horta (1995) e Pinheiro (1998), a prevenção terciária classifica-se pela prevenção na fase crónica³⁸ da lesão e da sua recidiva³⁹ assim como a reinserção do indivíduo na AF.

³³ “Dopagem é qualquer processo utilizado para aumentar de forma anormal o rendimento geral, físico ou mental de um indivíduo” (Manuila, 2004, p.206).

³⁴ Ver APÊNDICE F.

³⁵ Existem dois tipos de hidratos de carbono, os simples e os complexos. Os hidratos de carbono simples são de fácil digestão e absorção pelo organismo (e.g. açúcar, mel, produtos de pastelaria). Os hidratos de carbono complexos são de lenta digestão e absorção (e.g. pão, massas, batatas) (Sharkey, 1997).

³⁶ Ver APÊNDICE H.

³⁷ “...constata-se que, em média, a perda de 3% de água diminui a duração do esforço em 20% e aumenta a FC (Frequência Cardíaca) de 5%; para uma perda de 5% de água a diminuição do rendimento baixa 40% e eleva a FC de 10%, 6% de perda provoca náuseas, 10% delírio e 20% danos irreversíveis” (REFE, 2002, p.B-9).

³⁸ Fase de evolução lenta ou de longa duração (Manuila, 2004).

³⁹ “Reaparecimento de uma doença, depois de um período mais ou menos longo após a sua cura ou silenciamento” (Manuila, 2004, p.516).

Adoptámos para este efeito, a classificação de cuidados preventivos segundo Horta (1995) e Pinheiro (1998), que distinguem três níveis de prevenção: prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária.

3.3.1 PREVENÇÃO PRIMÁRIA

Neste nível de prevenção, Horta (1995) considera duas vertentes: uma primeira constituída pelas medidas cujo objectivo é promover, a saúde envolvendo a “nutrição”⁴⁰, o desenvolvimento da personalidade” e a “educação para a saúde”, entre outras; a segunda vertente abrange os cuidados que contribuem para reduzir a incidência de lesões ou acidentes (esta vertente compreende a selecção do equipamento, as condições e programação dos treinos, a higiene física e mental e ainda a alimentação). Para Pinheiro (1998), este nível de prevenção envolve a realização de um exame médico e a implementação de programas técnicos que actuem a nível da flexibilidade, do fortalecimento muscular e do treino proprioceptivo⁴¹.

3.3.2 PREVENÇÃO SECUNDÁRIA

A prevenção secundária visa o diagnóstico precoce e a intervenção terapêutica mais correcta de forma a minimizar as consequências da lesão, evitar futuras complicações e sequelas, para que o indivíduo possa retornar à AF o mais rápido possível (Horta, 1995). A procura da orientação de um médico ou de um fisioterapeuta contribuem para prevenir futuros desconfortos cardiorespiratórios e músculo-esqueléticos aquando do retorno à prática de AF (Simões, 2005).

3.3.2.1 Caracterização do Sistema de Resposta Médico

No seguimento da ocorrência de uma lesão os alunos das IESM têm à sua disposição um conjunto de serviços médicos nas próprias IESM ou nos Hospitais Militares (serviços médicos militares), ou em Clínicas e Hospitais civis.

A nível das próprias IESM, os alunos podem recorrer a cuidados de saúde prestados nas respectivas enfermarias, onde periodicamente se realizam consultas médicas de clínica geral e consultas de especialidade como ortopedia. É aqui que se procede a um rastreio da lesão, se define a sua gravidade e, caso necessário, se encaminha o aluno para o respectivo Hospital Militar.

⁴⁰ Ver APÊNDICE F.

⁴¹ “A propriocepção resulta de um processo através do qual o sistema nervoso central recebe input de diversas fontes de estímulo que integra para definir o movimento ou a posição articular” (Ribeiro & Oliveira, 2008, p.17).

Na fase de recuperação da lesão, o aluno tem à sua disponibilidade um fisioterapeuta nas IESM que trabalha com os alunos para que estes retomem a AF totalmente recuperados e o mais rapidamente possível.

Existe ainda a possibilidade dos alunos recorrerem a cuidados de saúde prestados em Clínicas e Hospitais civis. No entanto, os alunos sujeitam-se a suportar possíveis encargos monetários e estão limitados a horários de consultas que não se coadunam com os horários escolares e actividades extra curriculares.

A Figura 3.1 mostra a tipologia de serviços médicos a que os alunos podem recorrer no seguimento de uma lesão.




Figura 3.1: Sistema de resposta médico.

3.3.3 PREVENÇÃO TERCIÁRIA

A prevenção terciária envolve a prevenção na fase crónica da lesão, a reincidência da lesão e a reintegração do indivíduo na prática da AF após a ocorrência de lesão (Horta, 1995). A fim de evitar a reincidência da lesão sob forma crónica é necessária uma avaliação e reabilitação das alterações que ocorrem no corpo e que são originadas pela AF (Simões, 2005).

PARTE II - PRÁTICA

CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA

4.1 INTRODUÇÃO

Este capítulo trata da metodologia científica adoptada para a realização deste trabalho. Especifica-se o método de abordagem utilizado, as características da população em estudo, a forma como se procedeu à recolha de informação e os instrumentos e técnicas utilizadas. O instrumento de recolha de dados utilizado foi o inquérito.

4.2 MÉTODO DE ABORDAGEM

Dada a abundância de informação sobre o tema em causa, foi necessário filtrar a informação retirada através da análise de documentos existentes até à data e de trabalhos realizados neste âmbito. Efectuou-se uma pesquisa em bibliotecas locais, como a biblioteca municipal D. Dinis e a biblioteca municipal António Botto; em bibliotecas universitárias, nomeadamente na biblioteca da Faculdade de Motricidade Humana, e em repositórios, particularmente o repositório da Faculdade de Desporto do Porto.

A fase prática foi constituída, especificamente, por questões relacionadas com a temática do estudo direccionadas para alunos das IESM.

Os métodos utilizados para a realização deste trabalho foram o método indutivo com a selecção de uma amostra da população do estudo, a partir da qual se extraíram conclusões que se generalizaram para essa mesma população e o método inquisitivo através dos inquéritos realizados a uma amostra previamente seleccionada.

4.3 PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS

A fase exploratória foi baseada em literatura relacionada com AF e Medicina Desportiva, através da leitura de diversas obras bibliográficas e da análise de documentos e trabalhos especializados na área acima referida. Foi esta informação recolhida, que possibilitou desenvolver a problemática deste trabalho e limitar os assuntos que constituem a base teórica incluída na primeira parte.

Os critérios utilizados na escolha das leituras foram os referidos por Quivy & Campenhoudt (2008). Esta escolha foi baseada na pergunta de partida e sofreu um processo de selecção e análise apenas de algumas obras, evitando assim o excesso de informação, com vista a recolher a informação suficiente para uma correcta análise. Após cada leitura, foram

realizados resumos para possibilitar a sistematização de ideias essenciais. Alguns dos textos analisados foram alvo de debate com o orientador do trabalho.

A fase exploratória e a revisão bibliográfica tornaram-se indispensáveis na delimitação e escolha das questões a abordar e na realização do conteúdo teórico deste trabalho. Desta forma, foram seleccionadas duas variáveis para analisar as lesões que decorrem de AF, são elas, as características das lesões físicas e as medidas preventivas.

O objecto de estudo são as lesões sofridas pelos alunos das IESM e foram utilizados instrumentos de recolha de dados e informações que constituíram a parte prática desta investigação, tendo sempre em consideração as variáveis acima referidas.

O instrumento elaborado e aplicado foi o inquérito que será, de seguida, analisado em detalhe.

Para a redacção do trabalho foram aplicadas as Orientações para Redacção de Trabalhos da AM (2008), complementadas com o Guia Prático sobre Metodologia Científica de Manuela Sarmiento (2008) para questões estruturais e com o Manual de Investigação em Ciências Sociais de Raymond Quivy e LucVan Campenhoudt (2008) para questões de índole metodológica.

4.3.1 INQUÉRITOS

Optou-se pela aplicação de inquéritos por questionários, como uma forma de recolha de dados necessários de modo acessível. O questionário⁴² utilizado foi retirado de dois estudos realizados no mesmo âmbito e com fins semelhantes. Inicialmente realizado por Marmeleira (2003), o questionário foi posteriormente adaptado para o estudo realizado por Nunes (2008).

O questionário reúne questões seleccionadas de ambos os estudos e a sua versão final resulta dos ajustamentos a que foram sujeitas as versões anteriores.

Este questionário foi submetido a uma revisão de coerência e validação por especialistas no domínio técnico-científico em investigação, nomeadamente, a Professora Doutora Ana Bandeira e o Tenente-Coronel Palma Rosinha.

O questionário é composto por questões de resposta fechada e de escolha múltipla. O seu preenchimento é de resposta rápida, com uma duração de preenchimento estimada entre 15 a 20 minutos.

Quanto à sua estrutura, inicialmente apresenta-se uma breve introdução na qual são descritos os objectivos do estudo, a quem é dirigido e o período de tempo previsto para o seu total preenchimento. Posteriormente distinguem-se três grupos de questões. O primeiro grupo contém questões relativas a dados pessoais. De seguida, o segundo grupo encerra

⁴² Ver APÊNDICE J.

questões de índole preventiva e o terceiro e último grupo está relacionado com as características das lesões e o acompanhamento médico dos alunos no seguimento das mesmas.

Após a colecta dos questionários procedeu-se à avaliação das respostas, através da verificação de erros e da validação das respostas, verificando-se 108 respostas válidas⁴³, o que representa um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%⁴⁴.

Caracterização da População e da Amostra

A população deste inquérito é constituída pela totalidade dos alunos de 4ºano das IESM, ou seja, 115 cadetes da AM e 34 cadetes da AFA, completando um total de 149 alunos.

A amostra é constituída por alunos do 4.ºano de ensino da AM e da AFA. Como alunos finalistas, possuem um maior historial no que diz respeito a lesões físicas.

Devido à falta de disponibilidade de alguns alunos para o preenchimento do inquérito na data estabelecida, foram inquiridos 111 alunos da AM e 20 alunos da AFA. Sendo assim, esta amostra é constituída por um total de 131 alunos do 4º ano de ensino das IESM.

4.4 MEIOS UTILIZADOS

O questionário foi aplicado após o contacto com as entidades competentes, tendo sido obtida a devida autorização para a sua aplicação. Na AM, o questionário foi aplicado a dia 21 de Março de 2011 e na AFA foi aplicado a dia 17 de Março de 2011.

Para a análise dos dados foi utilizado o programa informático SPSS para *Windows*, *copyright* SPSS Inc., versão 17.0. Após introduzidos os dados relativos aos questionários numa base de dados, criada no programa acima referido, procedeu-se ao seu tratamento estatístico⁴⁵, através de estatística descritiva e comparação de casos.

⁴³ Taxa de respostas válidas de 72%.

⁴⁴ Ver APÊNDICE M.

⁴⁵ Ver APÊNDICE L.

CAPÍTULO 5 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO

5.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo será realizada uma análise e discussão dos resultados obtidos do questionário. Foram utilizados métodos de estatística descritiva e comparação de meios aplicados às diferentes frequências obtidas pelos inquiridos, nas várias questões que constituem o questionário.

Os resultados são válidos para o período temporal compreendido entre a data de ingresso dos alunos para as IESM e a data de realização do questionário.

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

O questionário foi aplicado a uma amostra de 131 alunos do 4º ano de ensino da Academia Militar e da Academia da Força Aérea, cuja distribuição se verifica no gráfico 5.1. Quanto ao género, distinguem-se 120 alunos masculinos (91,6%) e 11 alunas femininas (8,40%) como se pode observar no gráfico 5.2. As idades dos inquiridos estão compreendidas entre os 21 e os 30 anos como se verifica no gráfico 5.3.




Gráfico 5.1: Distribuição da amostra por IESM.




Gráfico 5.2: Distribuição da amostra por género.




Gráfico 5.3: Distribuição da amostra por idade.

5.3 ANÁLISE DE RESULTADOS

Nesta análise serão feitas referências a valores resultantes do estudo estatístico que se encontram no Apêndice L, nas Secções L.1; L.2 e L.3.

A análise será realizada com base em valores referentes à totalidade dos inquiridos e segundo os grupos B e C do questionário, respectivamente, dados sobre o treino e dados sobre lesões. No entanto, devido à extensão dos grupos, foram seleccionadas as questões mais pertinentes ao estudo.

Iniciando pelo grupo B, questão n.º2, **“Antes de iniciar o treino/aula realiza/realizava algum aquecimento?”**, verifica-se que 79 alunos (60,3%) realizam esporadicamente exercícios de aquecimento enquanto os restantes 52 (39,7%) realizam sempre. Não se registou nenhum aluno que nunca realizasse exercícios de aquecimento antes da prática de AF. O tempo médio de aquecimento dos alunos, segundo a resposta de 70 alunos (53,4%), é entre 6 a 10 minutos.




Gráfico 5.4: Proporção de alunos em relação à realização de aquecimento antes de iniciar a AF.

Quanto à questão n.º 4, **“Realiza/realizava exercícios de alongamento ou outros exercícios de retorno à calma no final do treino/aula?”**, 94 alunos (71,8%) realiza exercícios de alongamento e retorno à calma apenas esporadicamente e os restantes 34 (26,0%) responderam que realizam este tipo de exercícios sempre que terminam o treino/aula. Apenas 3 alunos (2,3%), responderam que nunca realizam estes exercícios.



Gráfico 5.5: Proporção de alunos em relação à realização de alongamentos ou exercícios de retorno à calma.

Na questão n.º5, “**Em que tipo de piso mais frequentemente realiza/realizava o treino/aula?**”, verifica-se que 91 alunos (69,5%) praticam AF em piso de alcatrão, enquanto 29 alunos (22,1%) responderam que utilizam habitualmente a terra batida. Apenas 2 alunos (1,5%) praticam AF em relva e 8 alunos (6,1%) utilizam outro tipo de pisos (e.g. tartan, piso sintético). O facto da existência de circuitos maiores em alcatrão nas IESM pode explicar o facto da maior parte dos alunos o utilizar para a prática de AF.



Gráfico 5.6: Proporção de alunos em relação à prática de AF em diferentes tipos de superfície.

Em relação à questão n.º6, “**Muda de calçado com que frequência?**”, 63 alunos (48,1%) responderam “todos os anos”, 21 alunos (16,0%) responderam “nunca”. Apenas 2 alunos (1,5%) responderam que mudam de calçado segundo uma frequência de “menos de 3 meses”.




Gráfico 5.7: Proporção de alunos em relação à frequência de mudança de calçado.

Relativamente à questão n.º7, “**Utiliza/ utilizava regularmente algum aparelho ortopédico na prática de actividade física?**”, 110 alunos (84,0%) responderam que “Não” e os restantes 21 (16,0%) responderam que “Sim”. Os aparelhos mais utilizados entre os 21 alunos são as palmilhas com um total de 14 respostas (10,7%) e as joelheiras com 9 respostas (6,9%). De notar que alguns alunos afirmaram utilizar mais do que um aparelho ortopédico.




Gráfico 5.8: Proporção de alunos em relação ao uso de aparelhos ortopédicos na prática de AF.




Gráfico 5.9: Proporção de alunos que usam aparelhos ortopédicos em relação ao tipo de aparelho.

No grupo C, questão n.º1, “**Sofreu lesões desde a sua entrada no ensino superior militar até à data?**”, verifica-se que 109 alunos (83,2%) sofreram lesões desde a sua entrada nas IESM até à data de realização do questionário e os restantes 22 alunos (16,8%) não sofreram quaisquer lesões durante o mesmo período.




Gráfico 5.10: Proporção de alunos em relação à frequência de lesão.

Relativamente à questão 1.1, **“Se sim, indique o número de lesões que sofreu”**, 33 alunos (25,2%) sofreram 1 única lesão durante o período respectivo, 26 alunos (19,8%) sofreram 2 lesões, 26 alunos (19,8%) sofreram 3 lesões, 16 alunos (12,2%) responderam ter sofrido 4 lesões e 7 alunos (5,3%) responderam ter sofrido 5 lesões. Apenas um aluno (0,8%) respondeu ter sofrido mais de 5 lesões.



Gráfico 5.11: Proporção de alunos em relação ao n.º de lesões no período determinado.

Em relação à questão n.º 1.2, **“Se sim indique os anos de ensino em que sofreu a lesão”**, distingue-se o 3ºano como o ano lectivo no qual ocorreu um maior número de lesões com 74 casos (56,5%) registados. O 2ºano obteve 56 casos (42,7%), o 1ºano e 4ºano com 50 (38,2%) e 49 casos (37,4%) respectivamente.




Gráfico 5.12: Proporção de alunos em relação à frequência de lesões por ano lectivo.

Relativamente à questão n.º2, “Indique o tipo de lesões que teve”, verifica-se que 42 alunos (32,1%) contraíram tendinites, 39 alunos (29,8%) sofreram entorses no tornozelo e 25 alunos (19,1%) sofreram lombalgias.




Gráfico 5.13: Proporção de alunos em relação à natureza das lesões.

Em relação a outras lesões que não se encontravam descritas no questionário, de referir que 8 alunos (6,1%) sofreram luxação e 6 alunos (4,6%) contraíram hérnias.




Gráfico 5.14: Proporção de alunos em relação a outros tipos de lesões.

Relativamente à questão n.º 3, “**Assinale exactamente, o local do corpo em que teve a lesão ou as lesões**” e em relação aos alunos que sofreram lesões, verifica-se que as zonas mais afectadas são o tornozelo/pé com um total de 65 respostas (49,6%), os joelhos com 53 respostas (40,4%) e a zona lombar com 29 respostas assinaladas (22,1%). A zona das canelas e a zona dos ombros obtiveram 20 (15,2%) e 19 (14,5%) respostas respectivamente.




Gráfico 5.15: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação à sua localização.

Relativamente à questão n.º 4, afirmações a, b, c, d, e, retira-se a seguinte questão geral, “**Em que situação contraiu a lesão?**”. De acordo com os alunos que contraíram lesões, o treino/aula obteve a maioria das respostas com 87 alunos (66,4%) que responderam

afirmativamente. As actividades extra-curriculares (como o rãguebi, basquetebol, prova challenger) obtiveram um total de 34 respostas (26,0%) e as lesões ocorridas fora de serviço sucederam a 9 alunos (6,9%). As outras actividades (*i.e.* actividades que não envolvem directamente a AF como tropeçar nas escadas) acumularam 5 respostas (3,8%). 13 Alunos (9,9%) não sabem como contraíram as lesões.




Gráfico 5.16: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação às actividades em que contraíram as lesões.

Quanto ao tipo de aula em que ocorreu a lesão, dos alunos que sofreram lesões durante as aulas, 42 alunos (32,1%) responderam que a lesão ocorreu durante a Instrução Militar e 23 alunos (17,6%) referiram que a lesão foi contraída durante uma corrida. Não responderam a esta questão 21 alunos (16,0%).




Gráfico 5.17: Proporção de alunos que contraíram lesões durante as aulas em relação ao tipo de aula na qual as contraíram.

Relativamente às afirmações f, g, h, a questão que se coloca é: **“O que fez no momento da lesão?”**, dos alunos que sofreram lesões, 53 alunos (40,5%) responderam que no momento da lesão interromperam de imediato a AF que estavam a realizar e 40 alunos (30,5%) pararam a AF só no final do treino/aula. Apenas 16 alunos (12,2%) continuaram a treinar sem restrições.





Gráfico 5.18: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação à atitude perante as lesões.

Relativamente às afirmações i, j, l, n, o, coloca-se a seguinte questão: **“A que serviços médicos recorreu após ter sofrido a lesão?”**, 71 alunos (54,2%) recorreram à enfermaria da Instituição, 64 (48,9%) recorreram ao médico da Instituição e o mesmo número de alunos recorreu a hospitais e clínicas civis. Ao fisioterapeuta da Instituição recorreram 44 alunos (33,6%) e 10 alunos (7,6%) não procuraram qualquer ajuda especializada no seguimento da lesão. De notar que a maior parte dos alunos recorreu a mais do que um serviço médico e apenas 7 alunos (5,3%) recorreram somente a serviços de saúde civis.



Serviço médico a que o aluno recorreu no seguimento da lesão
Gráfico 5.19: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação aos serviços médicos recorridos pelos mesmos.

Relativamente às afirmações p, q, a questão que se coloca é **“Efectuou tratamento da lesão?”**. No seguimento da lesão, 89 alunos (67,9%) efectuaram tratamento e 7 alunos (5,3%) afirmaram não terem efectuado qualquer tipo de tratamento. De notar que os 13 alunos restantes não responderam a esta questão.




Gráfico 5.20: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação ao tratamento realizado.

Em relação às afirmações r, s, t, coloca-se a questão: **“Recuperou totalmente da lesão?”**. 60 Alunos (45,8%) afirmaram ainda não terem recuperado totalmente da lesão e a lesão voltou a aparecer para 33 alunos (25,2%). No entanto 41 alunos (31,3%) afirmam estar totalmente recuperados da lesão contraída. De notar que alguns alunos deram mais que uma resposta.




Gráfico 5.21: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação à recuperação das mesmas.

Na questão n.º 5, “**Considera que a lesão/lesões que sofreu ficou a dever-se a quê?**”, verifica-se que dos alunos que sofreram lesões e segundo a percepção dos mesmos, 39 (29,8%) responderam que a lesão ficou a dever-se a sobrecarga do treino/aula, 38 (29,0%) responderam que a lesão deveu-se a um movimento brusco e 31 alunos (23,7%) apontaram a queda como causa da lesão. O mau aquecimento obteve 16 respostas (16,0%). Entre as outras causas verificam-se respostas como, a descontinuidade no treino e o tempo de repouso insuficiente. De notar que nesta questão, a maior parte dos alunos apontou mais do que uma causa da lesão.




Gráfico 5.22: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação às causas das mesmas segundo a percepção dos alunos.

Em relação à questão n.º 6, “**Considera que a lesão/lesões que sofreu poderá ter implicações futuras na sua vida?**”, verifica-se que dos 109 alunos (83,2%) que contraíram lesões, 74 (56,5%) afirmaram que a lesão contraída pode ter implicações futuras nas suas vidas e 35 (26,7%) responderam que a lesão não terá implicações futuras.




Gráfico 5.23: Proporção de alunos que sofreram lesões em relação às implicações futuras das lesões.

Relativamente à questão n.º 7, **“No período anterior ao seu ingresso no ensino superior militar tinha tido alguma lesão?”**, 83 alunos (63,4%) responderam que não sofreram quaisquer lesões antes do ingresso nas IESM enquanto 48 alunos (36,6%) responderam que contraíram lesões antes do seu ingresso. Os entorses e as fracturas são as lesões que se destacam do conjunto de lesões contraídas pelos alunos antes da entrada para a IESM. Os entorses obtiveram 19 respostas (14,5%) e as fracturas afectaram 9 alunos (6.9%).




Gráfico 5.24: Distribuição da amostra segundo a ocorrência de lesões anteriores.

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES

6.1 INTRODUÇÃO

O capítulo das conclusões tem como objectivo apresentar as reflexões finais sobre esta investigação respondendo inicialmente às perguntas derivadas, que se apresentaram como delimitadoras desta investigação e cujas verificações das respectivas hipóteses são determinantes para a responder à Pergunta de Partida.

Findas as reflexões conclusivas, serão apresentadas algumas recomendações, as principais limitações sentidas durante esta investigação e, por fim, propostas para investigações futuras que se julga do interesse nesta temática das lesões decorrentes de AF nas IESM.

6.2 VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES

Na procura de obtenção de resposta às perguntas derivadas e após os dados analisados, proceder-se-á à verificação das hipóteses levantadas no início desta investigação. Relativamente à primeira pergunta derivada, **“Qual a frequência de lesões nas Instituições de Ensino Superior Militar?”**, foi proposta a seguinte hipótese, **“A maioria dos alunos contrai pelo menos uma lesão durante os quatro anos de frequência na Instituição de Ensino Superior Militar.”** A hipótese verifica-se.

Através da análise documental, verificou-se que a exigência física mais elevada, como é o caso das aulas de Instrução militar ministradas nas IESM, não é dissociável da possibilidade de ocorrência de acidentes e lesões.

Da mesma forma, estudos anteriores (e.g. Gonçalves, 2006 e Nunes, 2008) realizados no mesmo âmbito constataram que a maioria dos alunos sofria lesões durante a frequência na IESM.

Através da análise dos questionários, verifica-se que 109 alunos, 83,2% da amostra, contraíram pelo menos uma lesão desde a sua entrada na IESM. Especificamente, 33 alunos contraíram uma lesão e os restantes 76 alunos contraíram entre 2 a 6 lesões.

Perante a segunda pergunta derivada, **“Qual a natureza e localização das lesões músculo-esqueléticas que ocorrem com maior frequência?”**, desenvolveu-se a hipótese, **“As lesões mais frequentes são entorses contraídas ao nível dos membros inferiores.”** A hipótese é válida.

Pela documentação analisada os entorses constituem as lesões mais comuns na prática de AF. Como se verificou no estudo estatístico, a natureza das lesões mais frequentes na prática de AF são entorses, que representam 38,2% dos alunos que contraíram lesões. Através da análise, verifica-se que a generalidade dos entorses localizam-se ao nível dos

membros inferiores. Assim sendo, 32,1% dos entorses que ocorrem a nível dos membros inferiores distribuem-se em 39 casos no tornozelo e 3 casos no joelho, estes últimos que se incluem na categoria dos entorses de outras articulações.

Na terceira pergunta derivada, **“Quais as actividades físicas em que surge um maior número de lesões?”**, a hipótese n.º3, **“A maioria das lesões sofridas pelos alunos são contraídas durante as aulas de Instrução Militar.”**, não se verifica.

A análise dos dados estatísticos indicou que apesar de os alunos contraírem lesões com frequência nas aulas de Instrução Militar, esta AF não manifesta a maioria das lesões contraídas pelos alunos. Como foi possível verificar através da análise dos dados dos questionários, outras actividades físicas como a Corrida (que obteve 17,6% das respostas) e a Equitação (que obteve 6,1% das respostas) dividem juntamente com a Instrução Militar (32,1% das respostas), a maioria das lesões contraídas em aulas pelos alunos.

Quanto à quarta pergunta derivada, **“Como se relaciona a ocorrência de lesões nos alunos com o emprego de medidas preventivas por parte dos mesmos?”**, levantou-se a hipótese n.º4, **“Os alunos que fazem sempre aquecimento antes da actividade física, sofrem menos lesões do que aqueles que só fazem por vezes.”** Esta hipótese não foi verificada.

Através da análise documental, verificámos como os exercícios de aquecimento que antecedem a prática de exercício físico constituem uma componente importante de qualquer AF.

Contudo, constatou-se que através da análise dos questionários, a maioria dos alunos realiza esporadicamente aquecimento antes da prática de AF e os restantes realizam sempre. Esta desproporcionalidade de respostas não possibilita estabelecer relações plausíveis entre os dados, não sendo assim possível averiguar a hipótese acima referida.

Para a quinta pergunta derivada, **“A que tipos de serviços médicos recorrem os alunos na sequência da lesão contraída?”**, foi proposta a hipótese n.º5, **“Os alunos que sofrem lesões recorrem, na sua maioria, a serviços de saúde militares.”**, a qual se verifica.

Pela análise estatística, constata-se que no seguimento da lesão os alunos recorrem, na sua maioria, aos serviços de saúde militares. Este acompanhamento inclui a enfermaria, o médico e o fisioterapeuta da Instituição. Registou-se uma maior afluência dos alunos à enfermaria, seguido pelo médico e por último o fisioterapeuta.

Relativamente à última pergunta derivada, **“Qual a situação do aluno no que respeita à recuperação da lesão?”**, desenvolveu-se a hipótese n.º6, **“Os alunos que contraíram lesões estão totalmente recuperados das mesmas.”** A hipótese não se verifica.

Os resultados dos dados estatísticos relativamente a esta hipótese revelam que apesar de 41 alunos (31,3%) terem recuperado totalmente da lesão, persistem 60 alunos (45,8%) que ainda não recuperaram totalmente da mesma.

6.3 RESPOSTA À PERGUNTA DE PARTIDA

Tendo por base a validação das hipóteses levantadas correspondentes às perguntas derivadas deste trabalho, procurou-se responder à pergunta de partida, **“Qual a caracterização das lesões e das medidas preventivas no que respeita à prática de actividade física nas Instituições de Ensino Superior Militar?”**

De entre a natureza das lesões decorrentes da prática de AF nas IESM, os resultados indicam que os entorses ao nível do tornozelo e outras articulações (nomeadamente o joelho) são as mais frequentes.

Quanto à percepção dos alunos em relação às causas das lesões e segundo uma categorização das mesmas, as causas mais apontadas como estando na génese da lesão foram o movimento brusco e a queda. Ambas representam um movimento repentino directo que, segundo os alunos, esteve na origem das lesões contraídas. Sendo assim, é possível classificar as mesmas como lesões macrotraumáticas.

Relativamente aos factores de risco de lesão, é possível identificar factores intrínsecos e extrínsecos. Quanto aos primeiros, foi verificada através da análise documental, a existência de discrepâncias na incidência de lesões consoante a idade e o género. No entanto, devido a uma amostra cujas idades correspondem a uma faixa etária mais restrita e tendo em conta a presença em maioria do género masculino, não é possível retirar quaisquer conclusões quanto a esta questão. Os factores psicológicos assumem um papel importante, pois verifica-se que a maior parte dos alunos que sofreram lesões, afirmam que estas terão possíveis implicações futuras nas suas vidas. Presume-se que este facto possa conduzir a determinados factores psicológicos como o stress e níveis baixos de confiança perante a possibilidade de as lesões se repercutirem em situações futuras.

Quanto aos factores extrínsecos, nomeadamente o planeamento de treino, constata-se que os alunos realizam esporadicamente exercícios de aquecimento antes da prática de AF com uma duração média entre os 6 e os 10 minutos. De igual forma, os exercícios de alongamento ou retorno à calma também são realizados apenas em certas ocasiões. Quanto ao local de treino, o piso mais utilizado para a prática de AF é o alcatrão. Apesar de nas IESM os percursos com diferentes níveis de intensidade (percurso plano e inclinado) serem de alcatrão, segundo a análise documental, os pisos duros não são considerados ideais para a prática de AF. No que respeita ao equipamento, regista-se a mudança de calçado de forma frequente pelos alunos.

Quando se trata de cuidados preventivos, verifica-se que esta não é uma prática recorrente em algumas das suas vertentes. Quanto à prevenção primária, os alunos em geral têm atenção ao equipamento, mas descuram a programação do treino, como o aquecimento e os alongamentos e optam pela utilização de um só piso para a maior parte dos treinos. No que respeita à prevenção secundária, verifica-se que a maior parte dos alunos recorre, no

seguimento das lesões, ao acompanhamento médico da Instituição e efectua o tratamento das mesmas. Por último, na prevenção terciária, os resultados dos questionários reflectem que a maioria dos alunos ainda não recuperou totalmente de lesões ou as lesões reapareceram.

6.4 REFLEXÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Seria importante desenvolver acções de consciencialização segundo uma vertente preventiva. Esta caracterizar-se-ia pela sensibilização para aspectos que condicionam os factores precursores de lesões, como a divulgação de cuidados preventivos, meios alternativos de prevenção e reabilitação, como a difusão de informação acerca das potencialidades das ligaduras funcionais e acções activas no âmbito da identificação e intervenção imediata face a uma lesão, como a divulgação de medidas de primeiros-socorros.

Como se verificou nos resultados dos questionários, a percentagem de alunos que ainda não recuperou totalmente da lesão e cuja lesão reapareceu é preocupante. Torna-se imperativo a avaliação do sistema de resposta, através da análise da existência dos principais pilares para uma intervenção terapêutica conveniente, como o caso do acesso célere à orientação de médicos da especialidade e fisioterapeutas. De igual forma, o valor de reincidência de lesões, presumivelmente devido ao retorno precoce à AF, justifica a presença de um programa de avaliação funcional que permita o regresso, em tempo adequado, do aluno à prática de AF após um período de recuperação. Para o efeito, um programa de testes físicos funcionais auxiliariam na caracterização do estado do aluno antes do seu retorno à prática de AF, com o intuito de reduzir o risco de reincidência de lesão e aumentar os níveis de confiança do aluno.

6.5 LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO

Durante a realização da investigação o grande obstáculo encontrado resumiu-se à recolha das informações, nomeadamente os questionários, em grande parte devido ao processo moroso de autorização para aplicação dos questionários, facto que impossibilitou a aplicação dos mesmos na Escola Naval.

O número de páginas disponibilizadas também se revelou um grande entrave para a redacção do trabalho. Julgando-se, por isso, que seria mais produtivo para este tipo de investigações um maior número de páginas permitidas.

6.6 INVESTIGAÇÕES FUTURAS

Para investigações futuras seria interessante analisar o processo de recuperação funcional do aluno lesionado. A caracterização do tratamento imediato, a identificação do método terapêutico aplicado ao tratamento secundário da lesão, e a identificação das variáveis a ter em conta aquando do retorno à prática de AF, permitiria caracterizar e, caso necessário, ajustar a prevenção, de forma a reduzir a potencialidade de recidivas e sequelas que consequentemente se podem prolongar por toda a carreira.

Seria igualmente interessante realizar um estudo que analise em que ano lectivo existe uma maior frequência de lesões, de forma a identificar possíveis factores de risco, permitindo adequar a prevenção, tendo em consideração as exigências dos objectivos curriculares específicos.

BIBLIOGRAFIA

- Academia Militar (2008). *Orientações para redacção de trabalhos*. Lisboa: Academia Militar.
- Aires, L. (2009). *Níveis de actividade física, aptidão física e excesso de peso/obesidade em crianças e adolescentes*, Dissertação de doutoramento em Actividade Física e Saúde. Porto: Faculdade de Desporto. Internet: <http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/17971/2/8703.pdf> acedido em 18 de Fevereiro de 2011.
- American Academy of Orthopaedic Surgeons (2011). Internet: <http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00029> acedido em 1 de Março de 2011.
- Baptista, A. F. P. (1924). *Joelho Valgo. Tese de Doutoramento*. Porto: Faculdade de Medicina do Porto. Internet: <http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/17740> acedido em 20 de Março de 2011.
- Barata, T., et.al. (1997). *Actividade Física e Medicina Moderna*. Póvoa de Sto Adrião: Europress.
- Barata, J. & Coelho, O. (1998). *Hoje há Educação Física*. Lisboa: Texto Editora.
- Basset, D. (2000). Validity and Reability Issues in Objective Monitoring of Physical Activity. *Research Quarterly for exercise and Sport*, 71 (2), 30-36.
- Carazzato, J. G. *Aspectos Preventivos da Prática Esportiva*, (n.d.). Internet: <http://www.carazzato.com.br/artigosmedicos.asp> acedido em 5 de Janeiro de 2011.
- Carneiro, A. L., Lopes, T. & Moreira, A. L. (2002). *Mecanismos de Adaptação ao Exercício Físico*, Texto de apoio. Porto: Faculdade de medicina. Internet: http://fisiologia.med.up.pt/Textos_Apoio/cardiaco/Exercicio.pdf acedido a 18 de Fevereiro de 2011.
- Carvalho, R. C. (2009). *Aspectos Psicológicos das Lesões desportivas: prevenção e Tratamento*. Internet: http://www.psicologia.com.pt/artigos/ver_artigo.php?codigo=A0475&area=d14&subarea= acedido em 8 de Dezembro de 2010.
- Caspersen, C. J., Powell, K. E. & Christenson, G. M. (1985). *Physical Activity, Exercise, and Physical Fitness: Definitions and Distinctions for Health-Related Research*. Public Health Reports, 100(2), Internet: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1424733/> acedido em 7 de Fevereiro de 2011.
- Castelo, J., Barreto, H., Alves, F., Mil-Homens Santos, P., Carvalho, J. & Vieira, J. (1996). *Metodologia da Treino Desportivo*. Cruz Quebrada: Faculdade de Motricidade Humana.
- Clayman, C. B., et al. (1993). *Ossos, Músculos e Articulações*. Minho: Civilização Editora. 7, 10-27.
- Crespo, X., Curell, N. & Curell, J. (1997). *Grande Enciclopédia das Ciências - Anatomia*. Lisboa: Ediclube.
- Direcção-Geral da Saúde. Internet: www.dgs.pt.

- Federação de Desportos de Inverno de Portugal. Internet: <http://www.fdiportugal.pt/> acedido em 21 de Fevereiro de 2011.
- Ferreira de Castro, M. A. (2005). *Lesões no Basquetebol Português: Enquadramento epidemiológico e análise biomecânica de um evento incitador da entorse do tornozelo*, Dissertação de doutoramento em Motricidade Humana. Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana.
- Ganhão, C., Ferreira, E., Pombeiro, J. P., Matos, N. (1998). Considerações sobre a Prevenção de Lesões no desporto e intervenção na Fase Aguda. *Treino Desportivo*, (5), 17-21.
- Gonçalves, P., & Mendes, R. (1991). Acidentes e Lesões em Educação Física. *Horizonte*, 8 (44).
- Gonçalves, A. F. (2005). Prevenção da lesão do Ligamento Cruzado Anterior. *Motricidade* 1 (4), 300-307.
- Gonçalves, D., E., M. (2006). *Caracterização das lesões adquiridas pelos alunos da Academia Militar*. Trabalho Final de Curso. Lisboa: Academia Militar.
- Harvard University (2010). Internet: <http://www.hsph.harvard.edu/faculty/walter-willett/> acedido em 21 de Março de 2011.
- Hirst, S. A., Armeau, E., Parish, T. (2007). Recognizing Anterior Cruciate Ligament Tears in Female Athletes: What Every Primary Care Practitioner Should Know. *The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice*, 5 (1). Internet: <http://ijahsp.nova.edu/articles/vol5num1/hirst.pdf> acedido em 20 de Fevereiro de 2011.
- Horta, L. (1995). *Prevenção de Lesões no desporto* (2.^a ed.). Lisboa: Caminho.
- Ireland, M. (2005). *Why are women more prone than men to ACL injuries*. Hughston Sports Medicine Foundation. Internet: <http://www.hughston.com/hha/a.acl.htm> acedido em 20 de Fevereiro de 2011.
- Kaplan, R., Sallis, J. F., Patterson, T. (1993). *Health and human behavior*. New York: McGrawHill.
- Kjaer, M., Magnusson, P., Krogsgaard, M., et.al. (2003). *Compêndio de Medicina Desportiva: ciência básica e aspectos clínicos da lesão desportiva e da actividade física*. Lisboa: Edições do Instituto Piaget.
- Manuila, L., Manuila, A., Lewalle, P. & Nicoulin, M. (2004). *Dicionário Médico* (3.^a ed.). Lisboa: Climepsi Editores.
- Marmeleira, J. (2003). *Lesões musculoesqueléticas em praticantes de corrida de médias e longas distâncias*, Dissertação de mestrado em Exercício e Saúde. Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana.
- Massada, L. (1987). *Lesões de Sobrecarga no Desporto*. Lisboa: Editorial Caminho.
- Massada, L. (1989). *Lesões Musculares no Desporto* (2.^a ed.). Lisboa: Editorial Caminho.
- Massada, L. (2003). *Lesões no desporto: Perfil traumatológico do jovem atleta português*. Lisboa: Editorial Caminho.
- Nigg, B. M. (1986). *Biomechanics of running shoes*. Champaign: Human Kinetics.

- Nunes, L. (1998). *Lesões mais comuns no desporto*. Lisboa: Dinalivro.
- Nunes, I. (2008). *Lesões desportivas em Instituições de Ensino Superior Militar*. Trabalho de Investigação Aplicada. Lisboa: Academia Militar.
- Onate, J. (2004). Military Sports Medicine: Preventing Injuries and Keeping Our Future Soldiers in the "Game". *Quest*, 7(2). Internet: <http://www.odu.edu/ao/instdv/quest/MilitaryMed.html> acedido em 13 de Novembro de 2010.
- Palmeira, A. (1998). Antecedentes psicológicos de la lesión deportiva. *Revista de Psicología del Deporte*, 8 (1), 117-132.
- Pascoal, A. G. (2003). Prevenção de Lesões Desportivas. *Sociedade Portuguesa de Educação Física* (26-27), 41-53.
- Pina, J. A. E. (2010). *Anatomia Humana da Locomoção* (4.^a ed.). Lisboa: Lidel.
- Pinheiro, J. P. (1998). *Medicina de Reabilitação em Traumatologia do Desporto*. Lisboa: Editorial Caminho.
- Pfeiffer, R., & Mangus, B. C. (1998). *Concepts of Athletic Training* (2.^a ed.). London: Jones and Bartlett Publishers.
- Prieto, R. G. (2007). El estrés y las lesiones deportivas (I). El estrés previo a la lesión. *Revista Digital*. Internet: <http://www.efdeportes.com/efd110/el-estres-y-las-lesiones-deportivas.htm> acedido em 20 de Fevereiro de 2011.
- Proença, A. (2008). *Ortopedia Traumatologia: Noções essenciais* (2.^a ed.). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- Quivy, R. & Campenhoudt, L. V. (2008). *Manual de Investigação em Ciências Sociais* (5.^a ed.). Lisboa: Gradiva.
- Raposo, A. V. (2000). *A Carga no Treino Desportivo*. Lisboa: Editorial Caminho.
- Regulamento de Educação Física do Exército (2002). Comando da Instrução do Exército: Repartição de Educação Física.
- Ribeiro, F. & Oliveira, J. (2008). Efeito da fadiga muscular local na propriocepção do joelho. *Revista Fisioterapia em Movimento*, 21 (2). Internet: <http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/15303?mode=full> acedido em 3 de Fevereiro de 2010.
- Rocha, João da Silva (1967). *Medicina Desportiva* (Vol. II). Lisboa: Edição da Federação Portuguesa de Futebol.
- Rodrigues, L. P. (1996). *Somatótipo. Métodos e aplicações*. Viana do Castelo: Escola Superior de Educação de Viana do Castelo. Internet: <http://www.esse.ipvvc.pt/lprodigues/DM2/aulas/textos/Somatotipo.pdf> acedido em 18 de Fevereiro de 2011.
- Rodrigues, R. A. B. (2007). A Importância da Educação Física Militar na Actividade Militar. *Revista de Artilharia*, (980-982), 37-46.
- Sarmiento, M. (2008). *Guia Prático sobre a Metodologia Científica* (1.^a ed.). Lisboa: Universidade Lusíada Editora.
- Seeley, R. R., Stephens, T. D. & Tate, P. (2001). *Anatomia & Fisiologia* (3.^aed.). Lisboa: Lusodidacta.

- Sharkey, B. J. (1997). *Fitness and Health* (4.^a ed.). United States of America: Human Kinetics.
- Simões, N. V. N. (2005). Lesões Desportivas em Praticantes de Actividade Física: Uma Revisão Bibliográfica. *Revista Brasileira de Fisioterapia*, 9(2). Internet: http://www.crefito3.com.br/revista/rbf/05v9n2/pdf/123_128_desportiva.pdf acedido em 15 de Dezembro de 2010.
- Teixeira, P., Sardinha, L. B. & Barata, J. L. T. (2008). *Nutrição, Exercício e Saúde*. Lisboa: Lidel.
- United States Department of Agriculture (2011). Internet: <http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome> acedido em 20 de Março de 2011.
- United States National Library of Medicine – National Institutes of Health (2009). Internet: www.nlm.nih.org acedido em 17 de Fevereiro de 2011.
- Viana de Queiroz, M. (2005). *Doenças Reumáticas: Manual de ajuda para adultos*. Lisboa: Direcção-Geral da Saúde. Internet: <http://www.dgs.pt/> acedido em 21 de Fevereiro de 2011.
- World Health Organization (2011). Internet: http://www.who.int/topics/physical_activity/en/ acedido em 18 de Fevereiro de 2011.

GLOSSÁRIO

Ácido láctico - Os músculos produzem ácido láctico quando existe a falta de oxigénio para satisfazer as necessidades energéticas. A acumulação deste ácido limita o funcionamento muscular (REFE, 2002).

Alongamentos – Conjunto de exercícios que permite o desenvolvimento da extensibilidade e elasticidade do músculo, contribuindo para melhorar a flexibilidade (REFE, 2002).

Anatomia - “...a ciência em que se estuda a estrutura e a forma dos corpos ou seres organizados” (Pina, 2010, p.3).

Aptidão física - No contexto militar, abrange um conjunto de qualidades físicas, psicológicas e culturais, que têm por base a prática de exercício físico, e que se assumem como indispensáveis ao desempenho das missões confiadas ao militar (REFE, 2002).

Aquecimento – Fase que antecede qualquer sessão que envolva actividade física e cujo objectivo é preparar o organismo, quer a nível mental quer a nível orgânico. Permite, entre outros, o aumento da temperatura corporal e o aumento dos débitos cardíaco e respiratório (REFE, 2002).

Articulação - Estrutura de ligação entre dois ou mais ossos (Nunes, 1998).

Artrologia - Parte da Anatomia que estuda as articulações (Pina, 2010).

Artroses - A artrose é uma doença que afecta as articulações importantes como as das mãos, pés, joelhos e coluna vertebral (Viana de Queiroz, 2005).

Cãibra - “Espasmo doloroso do músculo, usualmente do pé, perna ou coxa” (REFE, 2002).

Carga de treino – “...uma actividade funcional adicional do organismo (adicional em relação ao nível de repouso ou outro nível inicial), causada pela execução de exercícios de treino e pelo grau das dificuldades que vão sendo vencidas neste processo” (Raposo, 2000, p.21 segundo Matveiev, 1977).

Contractura - Resulta do esgotamento e da fadiga. É provocada pela produção em excesso de resíduos metabólicos, como o ácido láctico, prejudiciais para a zona afectada (Nunes, 1998).

Contusão - Lesão provocada por um choque (e.g. choque contra outro atleta, contra o terreno, ou contra outro objecto) (Rocha, 1967) e a sua gravidade depende da intensidade do choque ou da intensidade com que o objecto o atingiu (Nunes, 1998).

Desidratação - “Perda de água sem a correspondente e suficiente compensação” (REFE, 2002, p.B-9).

Distensão muscular - A distensão ocorre ao nível dos músculos quando se atinge o limite de elasticidade da fibra muscular (Nunes, 1998).

Dopagem - “...é qualquer processo utilizado para aumentar de forma anormal o rendimento geral, físico ou mental de um indivíduo” (Manuila, 2004, p.206).

Ectomorfo - Indivíduo com características de magreza acentuada e com aspecto de fragilidade (Rodrigues, 1996).

Educação Física Militar (EFM) - “...o conjunto das actividades físicas praticadas no seio do Exército, as quais, associadas à instrução técnica e tática, visam a preparação para o combate” (REFE, 2002).

Elasticidade muscular - Caracterizada pelo alongamento dos músculos, aumentado o seu comprimento e diminuindo o seu volume (Barata & Coelho, 1998).

Endomorfo - Indivíduo com características de obesidade, volume abdominal e laxidez muscular (Rodrigues, 1996).

Entorse - Lesões em que existe uma rotura parcial de um ligamento ou conjunto de ligamentos de uma articulação (Proença, 2008), mantendo porém, o contacto das superfícies ósseas (Nunes, 1998).

Etiologia – “Estudo das causas das doenças e (...) das próprias causas” (Manuila, 2004, p.252).

Fadiga - Condição que provoca a diminuição de desempenho e segundo a perspectiva bioquímica, significa um aumento de concentração de ácido láctico nos músculos (REFE, 2002).

Factores de risco - Factores que predisõem ao aparecimento de lesões (Pascoal, 2003).

Fase crónica – Fase de evolução lenta ou de longa duração (Manuila, 2004).

Fibras musculares - Constituintes dos músculos (Pina, 2010).

Fractura - “Uma fractura constitui uma rotura na continuidade de um osso” (Proença, 2008). Podem ser produzidas por um traumatismo violento, por fadiga ou sobrecarga ou por um traumatismo pequeno (Proença, 2008).

Fractura de fadiga - “...descontinuidade óssea que pode ser provocada por uma carga de treino elevada aplicada durante um longo período (e.g. corredores de maratona) ou depois de um treino intenso com cargas elevadas (e.g. saltadores em altura ou de triplo-salto) ...” (REFE, 2002, p.B-12).

Glúcidos - Ver hidratos de carbono.

Hidratos de carbono – Sinónimo de açúcar, glícido, glúcido (Manuila, 2004), os hidratos de carbono são a principal fonte de energia necessária às funções básicas, como a respiração, raciocínio, AF ou mesmo a digestão dos alimentos (Teixeira, Sardinha & Barata, 2008). Existem dois tipos de hidratos de carbono, os simples e os complexos: os hidratos de carbono simples são de fácil digestão e absorção pelo organismo (e.g. açúcar, mel, produtos de pastelaria, entre outros.) os hidratos de carbono complexos são de lenta digestão e absorção (e.g. pão, massas, batatas, entre outros) (Sharkey, 1997).

Homeostase – “Tendência do organismo para manter constantes as condições fisiológicas” (Manuila, 2004, p.325).

Laxidez - Laxidez refere-se ao aumento de mobilidade generalizada ou específica de uma articulação (Gonçalves, 2005).

Lesão - Todo o traumatismo que implica paragem de actividade física durante um determinado período de tempo (Massada, 2003).

Lesões agudas – Ver macrotraumatismos.

Lesões crónicas - Consequentes de lesões agudas (Rocha, 1967).

Lesões crónicas de início – Ver microtraumatismos.

Lesões macrotraumáticas - Originadas por um movimento repentino directo (Kjaer *et al.*, 2003).

Lesões microtraumáticas - Originadas pela actividade repetitiva de baixo impacto (Kjaer *et al.*, 2003).

Lesões músculo-esqueléticas - Lesões que ocorrem ao nível do sistema músculo-esquelético (Proença, 2008).

Lesões de *overstress* – Ver lesões macrotraumáticas.

Lesões de *overuse* ou de Sobrecarga – Ver lesões microtraumáticas.

Ligamento – Faixas de tecido conjuntivo que ligam os ossos e os mantêm na devida posição (Seeley, Stephens & Tate, 2001).

Luxação - Lesão através da qual existe a perda completa de contacto das superfícies articulares. Existem dois tipos de luxação, a total (as superfícies articulares perdem o total contacto) e a parcial ou subluxação (as superfícies articulares não perdem o contacto total) (Nunes, 1998).

Miologia - Parte da Anatomia que se dedica ao estudo dos músculos (Pina, 2010).

Musculopatias – Doenças relacionadas com os músculos (Manuila, 2004).

Neuromuscular - “Relativo aos nervos e aos músculos” (Manuila , 2004, p.430).

Nutrientes - Substâncias que provêm da digestão dos alimentos (e.g. lípidos, glúcidos e proteínas) que são essenciais pois fornecem a energia necessária às funções orgânicas (REFE, 2002).

Osteoarticulares - “Relativo aos ossos e às articulações” (Manuila, 2004, p.441).

Osteologia – A parte da Anatomia que se dedica ao estudo dos ossos (Pina, 2010).

Performance física – “...traduz a capacidade de um atleta num dado desporto, num dado momento” (REFE, 2002, p.B-21).

Propriocepção - “...resulta de um processo através do qual o sistema nervoso central recebe *input* de diversas fontes de estímulo que integra para definir o movimento ou a posição articular” (Ribeiro & Oliveira, 2008, p.17).

Recidiva - “Reaparecimento de uma doença, depois de um período mais ou menos longo após a sua cura ou silenciamento” (Manuila, 2004, p.516).

Rotura muscular - A rotura muscular resulta no rompimento das fibras musculares, que pode ser classificada de total (*i.e.* quando atinge a totalidade do músculo) ou parcial (mais comum na prática desportiva) e ocorre devido a contracções violentas e exageradas do músculo (Nunes, 1998).

Sistema – Conjunto dos órgãos que têm uma estrutura análoga (*e.g.* sistema muscular, ósseo, nervoso, cardiovascular) (Seeley, Stephens & Tate, 2001).

Sistema músculo-esquelético - Sistema constituído pelos ossos, músculos e articulações (Proença, 2008).

Somatotipologia - Técnica que categoriza a constituição do indivíduo (segundo características morfológicas passíveis de organização) em três componentes: endomorfismo, mesomorfismo e ectomorfismo. (Rodrigues, 1996).

Stress - Pressão forte e repentina sobre um organismo, indivíduo ou grupo e que acarreta reacções automáticas de alarme, defesa, fuga ou choque (REFE, 2002).

Subluxação – Luxação parcial, em que as superfícies articulares não perdem o contacto total (Rocha, 1967; Nunes, 1998).

Tecido – Formado por um grupo de células com estrutura e função semelhantes. Os tecidos são classificados em quatro tipos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso (Seeley, Stephens & Tate, 2001).

Tendão - Tecido de ligação através do qual um músculo se liga a um osso (Manuila, 2004).

Tendinite - “Inflamação de um tendão” (Manuila, 2004, p.583).

Tónus muscular - “Estado de tensão, ligeira mas permanente, que existe normalmente ao nível dos músculos. Desaparece quando o músculo é privado da sua inervação “ (Manuila, 2004, p.59).

Toxina - “Substância tóxica elaborada por certas bactérias” (Manuila, 2004, p.597).

Traumatismo - “Conjunto de manifestações locais ou gerais provocadas por uma acção violenta contra o organismo” (Manuila, 2004, p.601).

Traumatologia - Envolve as lesões produzidas por uma acção violenta de um agente exterior (Proença, 2008).

Valgo - O joelho valgo, também designado de “perna em X”, resulta de uma deformação do membro inferior na qual o joelho sofre um desvio para dentro, segundo a linha média do corpo (Baptista, 1924).

APÊNDICES

APÊNDICE A

SISTEMA ÓSSEO

Na Figura A.1 podemos observar os principais ossos do sistema esquelético, que se divide em duas partes: o esqueleto axial e o esqueleto apendicular (Clayman *et al.*, 1993).




Figura A.1: Esqueleto humano aspecto anterior.

Fonte: Clayman *et al.* (1993, p.11).

O sistema esquelético, possui funções de suporte (o osso rígido e forte, é o principal de suporte do organismo); confere protecção aos órgãos que protege (devido à sua dureza); possibilita os movimentos do corpo (através da contracção dos músculos que se inserem nos ossos através de tendões); é local de armazenamento de minerais presentes no sangue (e.g. cálcio e fósforo) e produz elementos sanguíneos (Seeley, Stephens & Tate, 2001).

As fracturas são lesões que “...constituem uma rotura na continuidade de um osso” (Proença, 2008, p.30). Podem distinguir-se em fractura articular, que envolve a superfície articular de uma articulação, fractura fechada, como se pode observar na Figura A.2, quando a pele permanece intacta ou com feridas superficiais e fractura exposta (ou aberta), como mostra a Figura A.3, no caso da ferida comunicar com a fractura (Proença, 2008). Segundo Nunes (1998), as lesões articulares, como os entorses ou as luxações também podem originar fracturas.




Figura A.2: Fractura da anca aspecto anterior.

Fonte: www.nlm.nih.gov



Figura A.1: Fractura exposta aspecto anterior.

Fonte: www.nlm.nih.gov

APÊNDICE B

SISTEMA MUSCULAR

Na Figura B.1 podemos observar o sistema muscular, com imagem do seu aspecto anterior à esquerda e imagem do seu aspecto posterior à direita.




Figura B.1: Músculos do corpo humano aspecto anterior e posterior.

Fonte: Clayman *et al.* (1993, pp.16-17).

B.1 CONSTITUIÇÃO DO MÚSCULO

A função do músculo é converter energia química em energia mecânica, através das suas proteínas contrácteis (miofibrilhas) (Barata *et al.*, 1997). A Figura B.2 ilustra a constituição de um músculo.




Figura B.2: Constituição do músculo.

Fonte: Clayman *et al.* (1993, p.18).

B.2 O TÔNUS MUSCULAR

De acordo com Clayman *et al.* (1993), o tônus muscular designa a tensão natural das fibras musculares.

Todos os músculos em descanso, encontram-se num estado parcial de contracção devido ao tônus muscular que em repouso ajuda a controlar a postura e a dar apoio (Clayman *et al.*, 1993).

Na figura B.3, para manter a cabeça levantada é necessária tensão constante nos músculos do pescoço. Quando nos sentimos sonolentos, a cabeça cai para a frente porque os músculos do pescoço descontraem (Clayman *et al.*, 1993).




Figura B.3: Músculos do pescoço aspecto posterior.

Fonte: Clayman *et al.*, (1993, p. 26).

Na figura B.4, o músculo quadricípite, situado na parte anterior da coxa, para se manter na posição vertical tem de se manter num estado constante de contracção, contudo ligeira, pois caso contrário o músculo ficaria cansado (Clayman *et al.*, 1993).




Figura B.4: Músculo quadricípite aspecto anterior.

Fonte: Clayman *et al.* (1993, p.26).

B.3 CLASSIFICAÇÃO DOS MÚSCULOS E FIBRAS MUSCULARES

Podemos classificar os músculos segundo dois grupos: músculos lisos (e.g. músculos da parede do estômago, bexiga e intestino) e músculos estriados, estes últimos que se subdividem em músculos cardíacos e esqueléticos (Nunes, 1998).

De acordo com o mesmo autor, nas fibras musculares distinguem-se, as fibras musculares esqueléticas, as fibras musculares lisas e as fibras musculares cardíacas.

Na Figura B.5, podemos observar, de cima para baixo: a célula da fibra muscular cardíaca, a célula da fibra muscular esquelética e a célula da fibra muscular lisa.




Figura B.5: Classificação das fibras musculares.

Fonte: www.nlm.nih.gov

B.4 RELAÇÃO ENTRE OS MÚSCULOS E OS TENDÕES

Os tendões permitem fixar os músculos nos ossos (Seeley, Stephens & Tate, 2001) como demonstrado na Figura B.6. A elasticidade dos tendões, embora reduzida, protege os músculos e os ligamentos de realizarem esforço excessivo (Crespo, X. Curell & N. Curell, 1997).




Figura B.6: Relação entre músculos e tendões. De cima para baixo, o osso, o tendão e o músculo.

Fonte: www.nlm.nih.gov

B.5 LESÕES MUSCULARES

B.5.1 DISTENSÃO MUSCULAR

Quando se rompem apenas algumas fibras musculares, a lesão denomina-se distensão muscular e provoca hemorragia, dores e inchaço (Clayman *et al.*, 1993). Na Figura B.7, observa-se a imagem do tecido muscular após ter sofrido uma distensão.




Figura B.7: Distensão muscular do gêmeo aspecto posterior.

Fonte: Clayman *et al.* (1993, p.102).

B.5.2 ROTURA MUSCULAR

Esta lesão é caracterizada pelo rompimento de um grande número de fibras musculares e provoca hemorragia, dores intensas e inchaço (Clayman *et al.*, 1993).

Na Figura B.8 podemos observar o rompimento de um grande número de fibras musculares (Clayman *et al.*, 1993).




Figura B.8: Rotura muscular do gêmeo aspecto posterior.

Fonte: Clayman *et al.* (1993, p.102).

APÊNDICE C

SISTEMA ARTICULAR

A função principal das articulações é unir dois ou mais ossos do sistema esquelético, conferindo-lhes estabilidade (Crespo, X. Curell & N. Curell, 1997), possibilitando e controlando os movimentos entre os mesmos (Seeley, Stephens & Tate, 2001).

As extremidades dos ossos estão ligadas por cordões de fibras chamados ligamentos (Clayman *et al.*, 1993). Os ligamentos são faixas de tecido conjuntivo fibroso cuja função é fixar os ossos uns aos outros (Seeley, Stephens & Tate, 2001), mantendo-os na devida posição, limitando a amplitude dos movimentos de cada articulação (Crespo, X. Curell & N. Curell, 1997).

Segundo Nunes (1998), as lesões mais comuns ao nível das articulações nos praticantes de AF são os entorses e as luxações.

C.1 LESÕES ARTICULARES

C.1.1 ENTORSE

Após a lesão, verifica-se a existência de uma rotura parcial dos ligamentos da articulação e inflamação da zona afectada (USNLM, 2009).

Na Figura C.1, observa-se o aspecto normal da articulação do tornozelo antes da ocorrência da lesão (aspecto anterior à esquerda e aspecto lateral à direita).




Figura C.1: Aspecto normal do tornozelo antes de ocorrer a lesão.

Fonte: www.nlm.nih.gov

Na Figura C.2, observa-se o aspecto da mesma articulação após a ocorrência da lesão (USNLM, 2009). Na figura observa-se o aspecto lateral ao centro e aspecto anterior, em cima à direita.




Figura C.2: Entorse do tornozelo.

Fonte: www.nlm.nih.gov

C.1.2 LUXAÇÃO

A Figura C.3 ilustra o aspecto normal da articulação do cotovelo (aspecto lateral), constituída pelos ossos: úmero (humerus), rádio (radius) e a Ulna (também conhecido por cúbito) (Pina, 2010; AAOS, 2007).



Figura C.3: Aspecto normal da articulação do cotovelo.

Fonte: www.aaos.org

Como se pode observar na Figura C.4, na subluxação (luxação parcial), as superfícies articulares não perdem o contacto total (Rocha, 1967; Nunes, 1998).




Figura C.4: Subluxação do cotovelo aspecto lateral.

Fonte: www.aaos.org

Quando a perda de contacto entre as superfícies articulares é total, estamos perante uma luxação total, como mostra a Figura C.5.




Figura C.5: Luxação total do cotovelo aspecto lateral

Fonte: www.aaos.org

Como se pode observar na Figura C.6, uma luxação pode originar fractura (Nunes, 1998), neste caso particular múltiplas fracturas.



Figura C.6: Luxação total do cotovelo com múltiplas fracturas aspecto lateral.

Fonte: www.aaos.org

APÊNDICE D

MODELO DA ETIOLOGIA DA LESÃO




Figura D.1: Modelo dinâmico, multifactorial da etiologia da lesão.

Fonte: Adaptado de Kjaer *et al.* (2003, p. 279); Ferreira de Castro (2005, p.28)

APÊNDICE E

IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO ENTRE ALUNO E EQUIPA MULTIDISCIPLINAR NAS LESÕES FÍSICAS

Na teoria, uma equipa multidisciplinar é de fácil planeamento, mas na prática é difícil de implementar porque depende da cooperação e do respeito mútuo dos seus intervenientes (Horta, 1995). O mesmo autor refere que existem áreas cuja responsabilidade é específica de determinados intervenientes, e.g. o diagnóstico de uma lesão é da responsabilidade do médico assim como o planeamento é da responsabilidade do instrutor. Contudo, Horta (1995) menciona que na prática existem “zonas cinzentas”⁴⁶, utilizadas por certos intervenientes para demonstrar o seu poder na “... tentativa de conquistarem um território que julgam ser sua terra e não terra de todos” (Horta, 1995, p.289)

Para implementar um programa de prevenção é necessária a intervenção de todos os agentes envolvidos na equipa disciplinar, e.g. o médico, o aluno, o instrutor, o dirigente, o fisioterapeuta, o enfermeiro (Horta, 1995).

O mesmo autor valoriza o papel do instrutor, do aluno e do médico nas diferentes fases de prevenção:

- 1) Na prevenção primária, a detecção e correcção de factores de risco de lesão, como o local de treino, a condição física, domínio da tarefa, competem fundamentalmente ao aluno e ao instrutor;
- 2) Na prevenção secundária o objectivo é obter um diagnóstico correcto e um tratamento adequado para um retorno o mais rápido possível à prática de AF. Embora o médico assuma a principal responsabilidade, nesta fase o instrutor pode ter um papel activo e importante em determinadas fases (e.g. no momento de ocorrência da lesão, deve reconhecer a gravidade da lesão e pressionar o aluno a recorrer a um médico, podendo recomendar ao mesmo as medidas de primeiros-socorros; deve garantir que o aluno não retorna precocemente à prática de AF;
- 3) Na prevenção terciária pretende-se que a lesão não reapareça. Para tal, deve existir uma reflexão por parte do médico, instrutor e aluno acerca dos factores de risco que originaram a lesão, para que estes sejam controlados, corrigidos ou compensados. Caso se verifique ainda a presença dos factores de risco, a lesão tende a reaparecer.

⁴⁶ Horta (1995) denomina de “zonas cinzentas”, as zonas que não são da responsabilidade de um só interveniente, mas sim zonas que dependem da cooperação de diferentes intervenientes.

APÊNDICE F

A IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO PARA O RENDIMENTO FÍSICO

Segundo Barata (1997, p.393), “Nutrição e actividade física são indissociáveis.” Uma alimentação correcta é indispensável à prática de AF, contudo esta última não constitui por si só a solução para maus hábitos alimentares (Barata *et al.*, 1997).

De acordo com o mesmo autor, uma alimentação para que seja considerada saudável deve obedecer a quatro critérios: deve ser diversificada e equilibrada; adequada em termos energéticos e repartida correctamente ao longo do dia.

Relativamente às proporções calóricas das refeições, 25% das calorias devem ser consumidas ao pequeno-almoço e ao jantar, 30% ao almoço e 10% a meio da manhã e meio da tarde. Se existir ceia, esta deverá ser ligeira, com cerca de 5% a 8% das calorias (Barata *et al.*, 1997).

Um estudo realizado a 348 treinadores e 2977 atletas de diferentes escolas e universidades acerca do conhecimento e práticas nutricionais que possuíam, revelou que 61% dos treinadores não possuíam formação a nível da nutrição e 78% não tinha conhecimento adequado acerca do assunto. Contudo, 71% dos atletas assumiram que praticavam uma alimentação equilibrada e referiram que os pais, anúncios de televisão e revistas eram as principais fontes de informação acerca de nutrição (Pfeiffer & Mangus, 1998).

Uma alimentação equilibrada contribui para a prevenção de lesões músculo-esqueléticas, (Ganhão *et al.*, 1998) e tem um impacto directo no desempenho do indivíduo, na recuperação do treino, na resistência às condições climatéricas adversas e na recuperação de lesões (Pfeiffer & Mangus, 1998).

Uma alimentação baseada no consumo excessivo de carnes, fritos e gorduras é prejudicial para o indivíduo que pratica AF, na medida em que as toxinas⁴⁷ contidas nestes alimentos vão alojar-se em determinados órgãos, nomeadamente nos músculos (Ganhão *et al.*, 1998). Contudo, as gorduras são indispensáveis na alimentação desde que em quantidades adequadas, pois além de serem consideradas uma fonte quase inesgotável de energia (mas que só são produtivas para um grande nível de esforço), são importantes na protecção do frio, como é o caso dos nadadores (Barata *et al.*, 1997). Constatou-se que nadadores que realizam provas que exigem grandes distâncias, como a travessia do canal da mancha, quando comparados com nadadores de piscina, possuem maior percentagem de massa gorda (Barata *et al.*, 1997). No entanto, o mesmo autor refere que este facto não é benéfico quando nos referimos a praticantes de maior nível de massa gorda a executar uma corrida de fundo, pois o arrefecimento torna-se mais difícil.

⁴⁷ “Substância tóxica elaborada por certas bactérias” (Manuila, 2004, p.597).

“A água é um elemento essencial no ser vivo” (Nunes, 1998, p.59). Segundo o mesmo autor, a água que ingerimos pode apresentar-se sob a forma líquida, através do leite, vinho, e outras bebidas, ou integrada nos alimentos. Um indivíduo activo de 70Kg, que coma 2500 Kcal por dia, deve ingerir 2,5 litros, dos quais 1,25 litro provém de líquidos, como a sopa, a água e outras bebidas e o restante faz parte dos alimentos (Nunes, 1998). Nunes refere ainda que no caso dos atletas, a hidratação deve ser imprescindível, para evitar a desidratação. A desidratação além de diminuir o rendimento do atleta contribui para a ocorrência de lesões como roturas musculares e tendinites (Ganhão *et al.*, 1998). Quando esta atinge um valor igual ou superior a 4% do peso total do corpo, ocorrem alterações fisiológicas como o aumento da frequência cardíaca ou a diminuição da tensão arterial (Nunes, 1998).

F.1 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

No ano de 1992, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), desenvolveu uma das primeiras pirâmides dos alimentos (Teixeira *et al.*, 2008) como se pode observar na Figura F.1. A base desta pirâmide era constituída pelos hidratos de carbono complexos como o pão ou as massas e significava que este tipo de alimentos deveria constituir a base da alimentação diária (Teixeira *et al.*, 2008). Por sua vez, no topo da pirâmide encontravam-se as gorduras sólidas como os óleos e o açúcar traduzindo que estes alimentos deveriam fazer parte da nossa alimentação ocasionalmente (Teixeira *et al.*, 2008).




Figura F.1: Pirâmide dos alimentos.

Fonte: www.cnpp.usda.gov

Em 2003, os cientistas da Universidade de Harvard, nomeadamente a equipa de Walter Willett⁴⁸, procederam a uma revisão do conhecimento adquirido na área da nutrição desde

⁴⁸ Frederick John Stare Walter Willett, professor de Epidemiologia e Nutrição da Universidade de Harvard. Internet: www.harvard.edu.

então e desenvolveram uma nova pirâmide designada de “Pirâmide da Alimentação Saudável” (Teixeira *et al.*, 2008) como ilustra a Figura F.2.




Figura F.2: "The healthy eating pyramid" - "Pirâmide da alimentação saudável".

Fonte: www.hsph.harvard.edu

No final do ano de 2005, é criada a “My Pyramid”⁴⁹, aprovadas pelo USDA, que encoraja os consumidores a fazerem escolhas mais saudáveis no que diz respeito à alimentação. Ao contrário dos modelos anteriores, os alimentos encontram-se repartidos por bandas verticais e não horizontais. A largura da banda indica a quantidade de porção do alimento - quanto maior a largura, maior a quantidade de alimentos desse grupo devemos comer (USDA, 2011), como se pode observar na Figura F.3.




Figura F.3: "My Pyramid".

Fonte: www.fns.usda.gov

⁴⁹ Tradução livre : A minha pirâmide.

F.1.2 RODA DOS ALIMENTOS PORTUGUESA

A roda dos alimentos portuguesa foi criada em 1977 para a Campanha de Educação Alimentar "Saber comer é saber viver" (Teixeira *et al.*, 2008). Contudo, a evolução científica dos últimos 25 anos tornou necessária a sua reestruturação. Na Nova Roda dos Alimentos (criada pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação) as principais alterações são a subdivisão de alguns grupos de alimentos e a indicação de porções diárias dos respectivos grupos alimentares (Teixeira *et al.*, 2008) como ilustra a Figura F.4.



Figura F.4: Roda dos alimentos portuguesa.

Fonte: www.dgs.pt

Segundo a Direcção-Geral da Saúde (DGS), a Nova Roda dos Alimentos é composta por 7 grupos de alimentos com diferentes dimensões e que estabelecem a proporção de peso que cada um deve ter na alimentação diária:

- Cereais e derivados, tubérculos – 28%
- Hortícolas – 23%
- Fruta – 20%
- Lacticínios – 18%
- Carnes, pescado e ovos – 5%
- Leguminosas – 4%
- Gorduras e óleos – 2%

A água não possui um grupo próprio e como tal, encontra-se no centro da roda.

APÊNDICE G

A CARGA DE TREINO

A carga de treino é definida como “...uma actividade funcional adicional do organismo (adicional em relação ao nível de repouso ou outro nível inicial), causada pela execução de exercícios de treino e pelo grau das dificuldades que vão sendo vencidas neste processo” (Raposo, 2000, p.21 segundo Matveiev, 1977).

A carga é, segundo Castelo *et al.* (1996), o principal elemento do treino que engloba o confronto do indivíduo com as exigências que o treino lhe apresenta. De acordo com o REFE (2002), a carga de treino é o nível de exigência energética de um exercício, sessão ou ciclo de trabalho.

Segundo a sua periodização, as cargas têm três tipos de aplicações, são estas: a carga regular, aplicada com maior frequência em fases iniciais de preparação física do indivíduo e nas actividades em que a resistência é importante; a carga acentuada, direccionada para o treino de capacidades bem determinadas com intensidade elevada, e por último, a carga concentrada, que envolve uma maior concentração de volume e intensidade de treino para o desenvolvimento de uma capacidade específica (Raposo, 2000 segundo Navarro, 1994).

A carga é orientada segundo a capacidade que se pretende otimizar (nos planos físico, técnico, tático ou psicológico) e segundo a fonte energética solicitada (processos aeróbios ou anaeróbios) (Castelo *et al.*, 1996). Segundo o mesmo autor, podemos classificar esta orientação da carga em carga selectiva, quando se privilegia uma determinada capacidade e uma determinada fonte energética e carga complexa, quando são solicitadas diferentes capacidades e diferentes fontes energéticas.

APÊNDICE H

A FADIGA

A fadiga representa “...um estado fisiológico particular e reversível que se manifesta numa descoordenação de funções dos órgãos e de diferentes sistemas enquanto consequência do trabalho do organismo durante e após os estímulos de treino ao qual se associa uma redução temporária da capacidade de rendimento do organismo” (Raposo, 2000, p.33 segundo Gottschalk, 1986).

A sobrecarga surge quando o treino supera a capacidade de rendimento e a tolerância do indivíduo à carga, fenómeno também designado por sobressolicitação e que provoca um aumento da fadiga (Raposo, 2000). O mesmo autor refere que a fadiga de sobrecarga resulta da acumulação de carga ao longo de várias sessões de treino.

Raposo (2000) segundo Harre (1997), distinguiu as principais causas para a fadiga de sobrecarga em dois grupos:

- 1) erros do processo de treino (inclui a não observação dos períodos de recuperação, o súbito aumento das exigências da carga, o recomeço de forma intensiva do treino após um período de interrupção do mesmo, e.g. por lesão ou doença);
- 2) factores que reduzem o rendimento (nos quais se incluem o modo de vida, e.g. sono insuficiente e erros alimentares, o meio ambiente, e.g. problemas familiares, e por último problemas de saúde).

APÊNDICE I

A RECUPERAÇÃO

A recuperação é definida como “...o processo de que transcorre após a interrupção da actividade responsável pelo surgimento da fadiga tendo como função restabelecer o estado de homeostasia alterado, assim como a capacidade de trabalho físico do atleta” (Raposo, 2000, p. 47 segundo Platonov, 1984).

Após uma carga de treino, o organismo vai evoluir de uma forma constante segundo quatro fases: a diminuição das capacidades, a restauração das capacidades (processo de regeneração do organismo após o esforço), a supercompensação (aumento da capacidade de rendimento) e a estabilização num nível próximo do inicial (Castelo *et al.*, 1996).

Castelo *et al.* (1996) segundo Bompa (1990) refere que do tempo total para a recuperação de uma carga de treino, 70% acontece no primeiro terço do tempo, 20% no segundo terço e 10% no terceiro terço como se pode observar na Figura I.1.




Figura I.1: Dinâmica da curva de recuperação.

Fonte: Castelo et al. (1996, p.16) segundo Bompa (1990).

De acordo com Raposo (2000), existem dois grandes métodos de recuperação: a recuperação activa e a recuperação passiva. Na recuperação activa, pretende-se facilitar e acelerar o processo de recuperação do indivíduo através de uma actividade, podendo englobar exercícios físicos de baixa intensidade, a mudança de actividade através de diferentes modalidades em diferentes locais ou a variação das formas de treino recorrendo ao arranjo da carga (Raposo, 2000).

A recuperação passiva recorre a meios de recuperação do indivíduo sem que exista AF no sentido de treino, tais como, o sono, uma adequada nutrição ou a farmacologia (Raposo, 2000).

APÊNDICE J

INQUÉRITO



ACADEMIA MILITAR

Direcção de Ensino

Mestrado Integrado em Ciências Militares – Especialidade de Artilharia

TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO APLICADA

INQUÉRITO

AUTORA: Aspirante Aluna Carina Sofia Rodrigues Carvalho

ORIENTADOR: Major de Infantaria José Custódio Reis Lopes Marques

Lisboa, Julho de 2011

Inquérito Nº _____

INTRODUÇÃO

Este inquérito é anónimo e será utilizado para fins estatísticos no âmbito do Trabalho de Investigação Aplicada da Aspirante de Artilharia Carina Sofia Rodrigues Carvalho, subordinado ao tema “Caracterização e Prevenção de lesões decorrentes de actividade física nas Instituições de Ensino Superior Militar”

As lesões físicas que decorrem de actividade física são inevitáveis. Por isso é importante conhecer a natureza da lesão para promover a sua prevenção e desta forma contribuir para o bem-estar físico, psíquico e emocional do aluno.

Este estudo incide sobre uma amostra representativa de alunos das Instituições de Ensino Superior Militar. Tem como objectivo caracterizar as lesões que decorrem da prática de actividade física e identificar as medidas preventivas que fazem face à sua ocorrência.

O seu contributo é importante. Por favor, disponibilize um pouco do seu tempo (cerca de 15 minutos) para responder ao questionário que se segue.

Precisamos de saber as características do seu treino e os problemas de lesões que eventualmente tenha sofrido. Responda de forma sincera a todas as questões.

Todos os dados recolhidos são estritamente confidenciais, e destinam-se somente para a realização deste estudo.

Obrigada pela vossa colaboração.

O questionário a que está prestes a responder, diz respeito ao tempo decorrente entre – a sua entrada no ensino superior militar e a presente data.

GRUPO A - DADOS PESSOAIS

1. Sexo:	<input type="checkbox"/> Masculino	<input type="checkbox"/> Feminino
2. Idade:	anos	
3. Peso:	Kg	
4. Altura:	m	
5. Pratica desporto fora do seu estabelecimento de ensino?	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim
5.1. Se “sim”, refira a(s) modalidade(s)?.....		

GRUPO B - DADOS SOBRE O TREINO

(desde a sua entrada no ensino militar até à data)

1. Em média, quantos treinos/aulas realiza/realizava semanalmente?
<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> mais de 5
2. Antes de iniciar o treino/aula realiza/realizava algum aquecimento? (alongamentos, mobilização articular, ou outros)
<input type="checkbox"/> sempre <input type="checkbox"/> por vezes <input type="checkbox"/> nunca
3. Qual a duração aproximada do aquecimento?
<input type="checkbox"/> até 5min. <input type="checkbox"/> 6 a 10min. <input type="checkbox"/> 10 a 15min. <input type="checkbox"/> 16 a 20min. <input type="checkbox"/> mais de 20min.
4. Realiza/realizava exercícios de alongamento ou outros exercícios de retorno à calma (andar, correr mais devagar) no final do treino/aula?
<input type="checkbox"/> sempre <input type="checkbox"/> por vezes <input type="checkbox"/> nunca
5. Em que o tipo de piso mais frequentemente realiza/realizava o treino/aula?
<input type="checkbox"/> alcatrão <input type="checkbox"/> relva <input type="checkbox"/> terra batida <input type="checkbox"/> outro Qual?.....
6. Muda de calçado com que frequência?
<input type="checkbox"/> menos de 3 meses <input type="checkbox"/> 3 a 9 meses <input type="checkbox"/> 9 meses a 1 ano <input type="checkbox"/> todos os anos
<input type="checkbox"/> nunca
7. Utiliza/utilizava regularmente algum aparelho ortopédico na prática de actividade física? (palmilhas, joelheiras, ou outros)
<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim
7.1 Se “sim”, qual ou quais?.....

Considere como lesão, toda a condição que tenha sentido durante e/ou após o exercício, que tenha implicado pelo menos uma das seguintes condições:

- Tenha sido motivo para interromper a actividade física pelo menos 24 horas.
- Não tendo havido interrupção, alterou o seu plano de treinos quantitativamente, e/ou qualitativamente.

GRUPO C - DADOS SOBRE LESÕES

1. Sofreu lesões desportivas desde a sua entrada no ensino superior militar até à data?

☐ Não (Se respondeu “não” passe para a pergunta nº7) ☐ Sim

1.1. Se “sim”, indique o número de lesões que sofreu:

1.2. Se “sim”, indique o(s) ano(s) de ensino em que sofreu a lesão/lesões e à frente de cada ano indique o respectivo número de lesões que sofreu:

☐ 1ºanolesões

☐ 2ºanolesões

☐ 3ºanolesões

☐ 4ºanolesões

Considere para as restantes questões todas as lesões que sofreu. Para tal, pode assinalar mais do que uma opção em cada pergunta.


2. No próximo quadro indique, assinalando com um X, o tipo de lesões que teve entre o período correspondente à sua entrada no ensino superior militar e a presente data, especificando, quando necessário, o local ou a tipologia das mesmas.

Por favor, leia todas as hipóteses antes de responder.

Tipo de Lesão	Assinale com	
	X	Especifique
Micro-rotura ou rotura muscular (“músculo rasgado”)		Local?
Entorse do tornozelo		
Entorse de outra articulação		Qual?
Fractura óssea		Local?
Lombalgia (dor na zona lombar das costas)		
Pubalgia (dor/inflamação na zona púbica ou da virilha)		
Canelite (dor/inflamação da zona da canela)		
Tendinite (dor/inflamação de um tendão)		Local?
Rotura parcial ou total de ligamentos de uma		Local?

articulação		
Rotura de um tendão (separação parcial ou total dum tendão do osso)		Local?
Outra:.....		Local?
Outra:.....		Local?

3. Em seguida assinale EXACTAMENTE, com um X, o local do corpo em que teve a lesão ou as lesões.



4. Seleccione, através de um X, as situações em que as afirmações apresentadas se verificaram relativamente à lesão ou lesões que sofreu.

Afirmação	X
a. A lesão foi contraída no treino/aula (Indique em que aula, ex.: corrida, boxe, natação, treino físico de aplicação militar – TFAM;)	
b. A lesão foi contraída em actividades extra-curriculares	
c. A lesão foi contraída fora de serviço	
d. A lesão foi contraída noutra actividade (Indique em que actividade)	
e. Não sabe como contraiu a lesão	
f. Continuou a treinar sem restrições	

g. Parou só no final da aula/treino	
h. Interrompeu de imediato a actividade física	
i. Procurou ajuda junto da enfermaria da Instituição	
j. Procurou a ajuda de um médico da Instituição (Indique a duração entre momento da lesão e 1ª consulta na especialidade) dias
l. Procurou a ajuda de um fisioterapeuta da Instituição	
m. Procurou outra ajuda Qual?.....	
n. Procurou ajuda fora da Instituição (ex. clínicas, hospitais ou consultórios civis) (Indique a duração entre momento da lesão e 1ª consulta na especialidade) dias
o. Não procurou ajuda especializada	
p. Efectuou tratamento	
q. Não efectuou qualquer tratamento	
r. Ainda não recuperou totalmente da lesão	
s. A lesão voltou a aparecer	
t. Recuperou totalmente da lesão (pratica actividade física sem restrições físicas e/ou médicas) (Indique o tempo que levou a recuperar) dias
u. Efectuou participação da lesão	

<p>5. Considera que a lesão/lesões que sofreu ficou a dever-se a quê?</p> <p> <input type="checkbox"/> Lesão anterior <input type="checkbox"/> Pouca flexibilidade <input type="checkbox"/> Sobrecarga <input type="checkbox"/> Movimento brusco <input type="checkbox"/> Queda <input type="checkbox"/> Mau aquecimento <input type="checkbox"/> Não sabe <input type="checkbox"/> Outra </p> <p>5.1 Caso tenha respondido “outra”, indique qual ou quais?.....</p>
<p>6. Considera que a lesão/lesões que sofreu poderá ter implicações futuras na sua vida?</p> <p> <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim </p>
<p>7. No período anterior ao seu ingresso no ensino superior militar tinha tido alguma lesão?</p> <p> <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim </p> <p>7.1. Se “sim”, qual o tipo de lesão ou lesões, e os locais das mesmas?.....</p> <p>.....</p>

FIM

MUITO OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO!

APÊNDICE L

VALORES ESTATÍSTICOS

L.1 TABELAS DE FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS DOS INQUIRIDOS

Amostra			
	Frequência	Porcentagem	Porcentagem Acumulada
Academia Militar	111	84,7	84,7
Academia da Força Aérea	20	15,3	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.1: Frequência e percentagem das respostas do total dos inquiridos.

L.1.2 RESPOSTAS DO GRUPO A

- QUESTÃO N.º 1 - GÉNERO

Na tabela L.2 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º1.

	Frequência	Porcentagem	Porcentagem Acumulada
Masculino	120	91,6	91,6
Feminino	11	8,4	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.2: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º1.

- QUESTÃO N.º 2 - IDADE

Na tabela L.3 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º2.

	Frequência	Porcentagem	Porcentagem Acumulada
21,00	22	16,8	16,8
22,00	42	32,1	48,9
23,00	31	23,7	72,5
24,00	15	11,5	84,0
25,00	7	5,3	89,3
26,00	8	6,1	95,4
27,00	2	1,5	96,9
28,00	1	0,8	97,7
29,00	1	0,8	98,5
30,00	2	1,5	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.3: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º2.

- QUESTÃO N.º 3 - PESO

Na tabela L.4 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º3.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
54,00	1	0,8	0,8
56,00	1	0,8	1,5
57,00	1	0,8	2,3
59,00	1	0,8	3,1
60,00	1	0,8	3,8
63,00	2	1,5	5,3
64,00	6	4,6	9,9
65,00	7	5,3	15,3
66,00	3	2,3	17,6
67,00	6	4,6	22,1
68,00	7	5,3	27,5
69,00	1	0,8	28,2
70,00	20	15,3	43,5
71,00	3	2,3	45,8
72,00	7	5,3	51,1
73,00	8	6,1	57,3
74,00	3	2,3	59,5
75,00	15	11,5	71,0
76,00	5	3,8	74,8
77,00	5	3,8	78,6
78,00	3	2,3	80,9
79,00	4	3,1	84,0
80,00	6	4,6	88,5
82,00	7	5,3	93,9
83,00	3	2,3	96,2
85,00	1	0,8	96,9
87,00	2	1,5	98,5
90,00	1	0,8	99,2
94,00	1	0,8	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.4: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º3.

• QUESTÃO N.º4 - ALTURA

Na tabela L.5 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º4.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
Não respondeu	20	15,3	15,3
160,00	3	2,3	17,6
163,00	2	1,5	19,1
164,00	1	0,8	19,8
165,00	1	0,8	20,6
166,00	2	1,5	22,1
167,00	1	0,8	22,9
168,00	3	2,3	25,2
169,00	3	2,3	27,5
170,00	5	3,8	31,3
171,00	1	0,8	32,1
172,00	6	4,6	36,6
173,00	5	3,8	40,5
174,00	6	4,6	45,0
175,00	14	10,7	55,7
176,00	14	10,7	66,4
177,00	4	3,1	69,5
178,00	4	3,1	72,5
180,00	12	9,2	81,7
181,00	4	3,1	84,7
182,00	5	3,8	88,5
183,00	3	2,3	90,8
184,00	4	3,1	93,9
186,00	1	0,8	94,7
187,00	3	2,3	96,9
188,00	2	1,5	98,5
189,00	1	0,8	99,2
190,00	1	0,8	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.5: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4.

- QUESTÃO N.º 5 – O ALUNO PRATICA DESPORTO FORA DAS IESM

Na tabela L.6 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º5.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
Não	82	62,6	62,6
Sim	49	37,4	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.6: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º5.

- QUESTÃO N.º 5.1 – MODALIDADES QUE O ALUNO PRATICA FORA DA IESM

Na tabela L.7 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º5.1.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Atletismo	19	14,5%	112	85,5%	131	100,0%
Futebol	13	9,9%	118	90,1%	131	100,0%
Ciclismo	13	9,9%	118	90,1%	131	100,0%
Natação	7	5,3%	124	94,7%	131	100,0%
Ginásio	7	5,3%	124	94,7%	131	100,0%
Outros	16	12,2%	115	87,8%	131	100,0%

Tabela L.7: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º5.1.

L.1.3 RESPOSTAS DO GRUPO B

- QUESTÃO N.º 1 – TREINOS/AULAS QUE O ALUNO REALIZA SEMANALMENTE

Na tabela L.8 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º1.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
3,00	6	4,6	4,6
4,00	7	5,3	9,9
5,00	47	35,9	45,8
mais de 5	71	54,2	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.8: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º1.

- QUESTÃO N.º 2 – REALIZAÇÃO DE AQUECIMENTO ANTES DE INÍCIO DO TREINO/AULA

Na tabela L.9 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º2.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
sempre	52	39,7	39,7
por vezes	79	60,3	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.9: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º2.

- QUESTÃO N.º 3 – DURAÇÃO APROXIMADA DO AQUECIMENTO

Na tabela L.10 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º3.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
até 5 min	54	41,2	41,2
6 a 10 min	70	53,4	94,7
11 a 15 min	7	5,3	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.10: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º3.

- QUESTÃO N.º 4 – REALIZAÇÃO DE ALONGAMENTOS OU OUTROS EXERCÍCIOS DE RETORNO À CALMA NO FINAL DO TREINO/AULA

Na tabela L.11 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º4.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
sempre	34	26,0	26,0
por vezes	94	71,8	97,7
nunca	3	2,3	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.11: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4.

- QUESTÃO N.º 5 – TIPOS DE PISO FREQUENTEMENTE UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DE AF

Na tabela L.12 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º5.1.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Alcatrão	91	69,5%	40	30,5%	131	100,0%
Relva	2	1,5%	129	98,5%	131	100,0%
Terra batida	29	22,1%	102	77,9%	131	100,0%
Outro	8	6,1%	123	93,9%	131	100,0%

Tabela L.12: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º5.

- QUESTÃO N.º 6 – FREQUÊNCIA DE MUDANÇA DE CALÇADO

Na tabela L.13 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º6.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
menos de 3 meses	2	1,5	1,5
3 a 9 meses	15	11,5	13,0
9 meses a 1 ano	29	22,1	35,1
todos os anos	63	48,1	83,2
nunca	21	16,0	99,2
Não respondeu	1	,8	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.13: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º6.

- QUESTÃO N.º 7 – UTILIZAÇÃO REGULAR DE APARELHOS ORTOPÉDICOS DURANTE A PRÁTICA DE AF

Na tabela L.14 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º7.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
Não	110	84,0	84,0
Sim	21	16,0	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.14: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º7.

- QUESTÃO N.º 7.1 – TIPOS DE APARELHOS ORTOPÉDICOS UTILIZADOS

Na tabela L.15 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º7.1.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Palmilhas	14	10,7%	117	89,3%	131	100,0%
Joelheiras	9	6,9%	122	93,1%	131	100,0%
Cinturão	2	1,5%	129	98,5%	131	100,0%
Ligaduras elásticas	4	3,1%	127	96,9%	131	100,0%

Tabela L.15: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º7.1.

L.1.4 RESPOSTAS DO GRUPO C

- QUESTÃO N.º 1 – FREQUÊNCIA DE LESÃO

Na tabela L.16 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º1.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
Não	22	16,8	16,8
Sim	109	83,2	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.16: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º1.

• QUESTÃO N.º 1.1 – NÚMERO DE LESÕES CONTRAÍDAS

Na tabela L.17 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º1.1.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
1,00	33	25,2	30,3
2,00	26	19,8	54,1
3,00	26	19,8	78,0
4,00	16	12,2	92,7
5,00	7	5,3	99,1
mais de 5	1	0,8	100,0
Total	109	83,2	
Excluídos	22	16,8	
Total	131	100,0	

Tabela L.17: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º1.1.

• QUESTÃO N.º 1.2 – FREQUÊNCIA DE LESÕES SEGUNDO O ANO LECTIVO

Na tabela L.18 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º1.2.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
1ºano	50	38,2%	81	61,8%	131	100,0%
2ºano	56	42,7%	75	57,3%	131	100,0%
3ºano	74	56,5%	57	43,5%	131	100,0%
4ºano	49	37,4%	82	62,6%	131	100,0%

Tabela L.18: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º1.2.

• QUESTÃO N.º 2 – NATUREZA DAS LESÕES

Na tabela L.19 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º2.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Microrotura	17	13,0%	114	87,0%	131	100,0%
Entorse do tornozelo	39	29,8%	92	70,2%	131	100,0%
Entorse de outra articulação	11	8,4%	120	91,6%	131	100,0%
Fractura	17	13,0%	114	87,0%	131	100,0%
Lombalgia	25	19,1%	106	80,9%	131	100,0%
Pubalgia	7	5,3%	124	94,7%	131	100,0%
Canelite	16	12,2%	115	87,8%	131	100,0%
Tendinite	36	27,5%	95	72,5%	131	100,0%
Rotura parcial ou total de ligamentos	17	13,0%	114	87,0%	131	100,0%
Rotura de um tendão	3	2,3%	128	97,7%	131	100,0%
Outra	19	14,5%	112	85,5%	131	100,0%

Tabela L.19: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º2.

• QUESTÃO N.º 2 – NATUREZA DE OUTRAS LESÕES

Na tabela L.20 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º2.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
Luxação	8	6,1	42,1
Contusão	1	,8	47,4
Hérnia	6	4,6	78,9
Radiomiólise	3	2,3	94,7
Distensão	1	,8	100,0
Total	19	14,5	
Excluídos	112	85,5	
Total	131	100,0	

Tabela L.20: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º2.

• QUESTÃO Nº 3 – LOCALIZAÇÃO DAS LESÕES

Na tabela L.21 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º3.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Coxa	4	3,1%	127	96,9%	131	100,0%
Joelho direito	29	22,1%	102	77,9%	131	100,0%
Joelho esquerdo	24	18,3%	107	81,7%	131	100,0%
Tornozelo/Pé direito	39	29,8%	92	70,2%	131	100,0%
Tornozelo/Pé esquerdo	26	19,8%	105	80,2%	131	100,0%
Canela direita	13	9,9%	118	90,1%	131	100,0%
Canela esquerda	7	5,3%	124	94,7%	131	100,0%
Gémeo direito	2	1,5%	129	98,5%	131	100,0%
Gémeo esquerdo	3	2,3%	128	97,7%	131	100,0%
Virilha	13	9,9%	118	90,1%	131	100,0%
Ombro direito	13	9,9%	118	90,1%	131	100,0%
Ombro esquerdo	6	4,6%	125	95,4%	131	100,0%
Punho direito	6	4,6%	125	95,4%	131	100,0%
Punho esquerdo	3	2,3%	128	97,7%	131	100,0%
Omoplata esquerda	3	2,3%	128	97,7%	131	100,0%
Cotovelo esquerdo	3	2,3%	128	97,7%	131	100,0%
Zona lombar	29	22,1%	102	77,9%	131	100,0%
Zona cervical	3	2,3%	128	97,7%	131	100,0%
Outras	5	3,8%	126	96,2%	131	100,0%

Tabela L.21: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º3.

- QUESTÃO N.º 3 – LOCALIZAÇÃO DE OUTRAS LESÕES

Na tabela L.22 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º3.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
Perónio	1	0,8	20,0
Tíbia	1	0,8	40,0
Anca	1	0,8	60,0
Costelas	1	0,8	80,0
Cabeça	1	0,8	100,0
Total	5	3,8	
Excluídas	126	96,2	
Total	131	100,0	

Tabela L.22: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º3.

- QUESTÃO N.º 4 – AFIRMAÇÕES a, b, c, d, e

Na tabela L.23 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º4, afirmações a, b, c, d, e.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Afirmação a.	87	66,4%	44	33,6%	131	100,0%
Afirmação b.	34	26,0%	97	74,0%	131	100,0%
Afirmação c.	9	6,9%	122	93,1%	131	100,0%
Afirmação d.	5	3,8%	126	96,2%	131	100,0%
Afirmação e.	13	9,9%	118	90,1%	131	100,0%

Tabela L.23: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmações a, b, c, d, e.

• QUESTÃO N.º 4 – AFIRMAÇÃO a

Na tabela L.24 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º4, afirmação a.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Instrução Militar	42	32,1%	89	67,9%	131	100,0%
Corrida	23	17,6%	108	82,4%	131	100,0%
Equitação	8	6,1%	123	93,9%	131	100,0%
Judo	3	2,3%	128	97,7%	131	100,0%
Boxe	4	3,1%	127	96,9%	131	100,0%
Ginástica	1	0,8%	130	99,2%	131	100,0%
Futsal	1	0,8%	130	99,2%	131	100,0%
Ginásio	1	0,8%	130	99,2%	131	100,0%
Basquetebol	1	0,8%	130	99,2%	131	100,0%
Não respondeu	21	16,0%	110	84,0%	131	100,0%

Tabela L.24: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmação a.

• QUESTÃO N.º 4 – AFIRMAÇÕES f, g, h

Na tabela L.25 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º4, afirmações f, g, h.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Afirmação f.	16	12,2%	115	87,8%	131	100,0%
Afirmação g.	40	30,5%	91	69,5%	131	100,0%
Afirmação h.	53	40,5%	78	59,5%	131	100,0%

Tabela L.25: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmações f, g, h.

• QUESTÃO N.º 4 – AFIRMAÇÕES i, j, l, n, o

Na tabela L.26 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º4, afirmações i, j, l, n, o.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Afirmação i.	71	54,2%	60	45,8%	131	100,0%
Afirmação j.	64	48,9%	67	51,1%	131	100,0%
Afirmação l.	44	33,6%	87	66,4%	131	100,0%
Afirmação n.	64	48,9%	67	51,1%	131	100,0%
Afirmação o.	10	7,6%	121	92,4%	131	100,0%

Tabela L.26: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmações i, j, l, n, o.

• QUESTÃO N.º 4 – AFIRMAÇÕES p, q

Na tabela L.27 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º4, afirmações p, q.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Afirmação p.	89	67,9%	42	32,1%	131	100,0%
Afirmação q.	7	5,3%	124	94,7%	131	100,0%

Tabela L.27: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmações p, q.

- QUESTÃO N.º 4 – AFIRMAÇÕES r, s, t

Na tabela L.28 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º4, afirmações r, s, t.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Afirmação r.	60	45,8%	71	54,2%	131	100,0%
Afirmação s.	33	25,2%	98	74,8%	131	100,0%
Afirmação t.	41	31,3%	90	68,7%	131	100,0%

Tabela L.28: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmações r, s, t.

- QUESTÃO N.º 4 – AFIRMAÇÃO u

Na tabela L.29 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º4, afirmação u.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Afirmação u.	50	38,2%	81	61,8%	131	100,0%

Tabela L.29: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º4, afirmação u.

• QUESTÃO N.º 5 – CAUSA DA LESÃO SEGUNDO A PERCEPÇÃO DO ALUNO

Na tabela L.30 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º5.

	Casos					
	Incluídos		Excluídos		Total	
	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem	Frequência	Percentagem
Lesão anterior	8	6,1%	123	93,9%	131	100,0%
Flexibilidade	1	0,8%	130	99,2%	131	100,0%
Sobrecarga	39	29,8%	92	70,2%	131	100,0%
Movimento brusco	38	29,0%	93	71,0%	131	100,0%
Queda	31	23,7%	100	76,3%	131	100,0%
Mau aquecimento	21	16,0%	110	84,0%	131	100,0%
Não sabe	16	12,2%	115	87,8%	131	100,0%
Outra	7	5,3%	124	94,7%	131	100,0%

Tabela L.30: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º5.

• QUESTÃO N.º 5.1 – OUTRAS CAUSAS SEGUNDO A PERCEPÇÃO DO ALUNO

Na tabela L.31 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º5.1.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
Descontinuidade na AF	1	0,8	14,3
Problema congénito	1	0,8	28,6
Tempo de repouso insuficiente	1	0,8	42,9
Mau planeamento de treino	1	0,8	57,1
Piso duro para correr	2	1,5	85,7
Não utilização de supressores de ruído numa sessão de tiro	1	0,8	100,0
Total	7	5,3	
Excluídas	124	94,7	
Total	131	100,0	

Tabela L.31: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º5.1.

- QUESTÃO N.º 6 – IMPLICAÇÕES FUTURAS

Na tabela L.32 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas da questão n.º6.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
Não	35	26,7	32,1
Sim	74	56,5	100,0
Total	109	83,2	
Excluídas	22	16,8	
Total	131	100,0	

Tabela L.32: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º6.

- QUESTÃO N.º 7 – LESÕES CONTRAÍDAS NO PERÍODO ANTERIOR AO INGRESSO NAS IESM

Na tabela L.33 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º7.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
Não	83	63,4	63,4
Sim	48	36,6	100,0
Total	131	100,0	

Tabela L.33: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º7.

- QUESTÃO N.º 7.1 – NATUREZA DAS LESÕES CONTRAÍDAS NO PERÍODO ANTERIOR AO INGRESSO NAS IESM

Na tabela L.34 apresenta-se a frequência e a percentagem de respostas incluídas e excluídas da questão n.º7.1.

	Frequência	Percentagem	Percentagem Acumulada
Fractura	9	6,9	19,6
Entorse	19	14,5	60,9
Tendinite	5	3,8	71,7
Luxação	4	3,1	80,4
Micro-rotura	1	0,8	82,6
Rotura muscular	2	1,5	87,0
Distensão muscular	1	0,8	89,1
Rotura de ligamentos de uma articulação	2	1,5	93,5
Lombalgia	1	0,8	95,7
Pubalgia	2	1,5	100,0
Total	46	35,1	
Excluídas	85	64,9	
Total	131	100,0	

Tabela L.34: Frequência e percentagem das respostas da questão n.º7.1.

APÊNDICE M

DEFINIÇÃO DA AMOSTRA

Segundo Sarmento (2008) para calcular a dimensão adequada da amostra (n) de uma população finita, quando se pretende estimar uma proporção (p), utiliza-se a expressão abaixo indicada referente a uma amostra aleatória simples e que garante um nível de confiança (λ) e um nível de precisão (D).

$$n = \frac{p \times (1 - p)}{\frac{D^2}{(Z_{\alpha/2})^2} + \frac{p \times (1 - p)}{N}}$$

Figura M.1: Expressão para calcular a dimensão adequada da amostra.

Fonte: Sarmento (2008, p.24).

n = amostra
 N = população
 p = proporção da população
 D = nível de precisão
 $Z_{\alpha/2}$ = Normal estandardizada

A dimensão da amostra foi calculada atendendo ao total de alunos do 4ºano existentes no universo, ou seja $N=149$ unidades. Como não se conhece a proporção (p), optou-se pela hipótese mais pessimista, isto é, $p = 5$.

Pretendeu-se realizar um estudo com validade de importante, como tal, a amostra foi calculada com um nível de confiança (λ) de 95% com uma margem de erro de 5% e com uma normal estandardizada de 1,96.

A Tabela M.1 apresenta a validade do estudo, em função do nível de confiança e da margem de erro.

Validade do Estudo	Nível de Confiança (λ)	Normal estandardizada $Z_{\alpha/2}$	Nível de significância ($\alpha = 1 - \lambda$)	Margem de erro (ε)
Muitíssimo Importante	99%	$\pm 2,58$	1%	2% ou 5%
Importante	95%	$\pm 1,96$	5%	5% ou 10%
Pouco Importante	68%	$\pm 32\%$	32%	5% ou 10%

Figura M.2: Validade do estudo.

Fonte: Sarmento (2008, p.25).

A dimensão da amostra foi calculada para o nível de confiança de 95%, o nível de erro de 5%, considerando o total de unidades existentes na população, ou seja 149 entidades. Para este nível de confiança, a amostra tem a dimensão de 108 inquéritos.

APÊNDICE N

MAPA CONCEPTUAL

